

表 3790 透析前収縮期血圧(mmHg) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	36 (0.0)	291 (0.1)	2,503 (1.3)	13,827 (6.9)	43,468 (21.7)	66,914 (33.5)	48,638 (24.3)	18,683 (9.3)	4,670 (2.3)	930 (0.5)	199,960 (100.0)	55,681	255,641	151.55	24.03
血液透析濾過 （％）	2 (0.0)	121 (0.3)	640 (1.8)	2,903 (8.0)	7,841 (21.7)	11,768 (32.6)	8,514 (23.6)	3,236 (9.0)	833 (2.3)	218 (0.6)	36,076 (100.0)	7,207	43,283	150.58	25.05
血液濾過 （％）				8 (9.1)	13 (14.8)	28 (31.8)	25 (28.4)	13 (14.8)	1 (1.1)		88 (100.0)	4	92	154.76	23.88
血液吸着透析 （％）	1 (0.1)	5 (0.4)	54 (4.0)	178 (13.3)	344 (25.7)	434 (32.4)	244 (18.2)	66 (4.9)	11 (0.8)	2 (0.1)	1,339 (100.0)	291	1,630	142.19	24.64
在宅血液透析 （％）		3 (0.9)	17 (5.3)	50 (15.6)	89 (27.8)	99 (30.9)	53 (16.6)	9 (2.8)			320 (100.0)	201	521	137.93	23.92
腹膜透析 （％）	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
合計 （％）	40 (0.0)	433 (0.2)	3,338 (1.4)	17,607 (7.3)	53,271 (22.0)	80,822 (33.3)	58,195 (24.0)	22,224 (9.2)	5,546 (2.3)	1,160 (0.5)	242,636 (100.0)	67,472	310,108	151.13	24.23
記載なし （％）															
総計 （％）	40 (0.0)	433 (0.2)	3,338 (1.4)	17,607 (7.3)	53,271 (22.0)	80,822 (33.3)	58,195 (24.0)	22,224 (9.2)	5,546 (2.3)	1,160 (0.5)	242,636 (100.0)	67,472	310,108	151.13	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査