

表 3794 透析前収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (1.5)	13 (19.7)	26 (39.4)	15 (22.7)	9 (13.6)		2 (3.0)			66 (100.0)	51	117	115.94	22.98
15歳～ (%)	1 (0.1)	2 (0.3)	12 (1.5)	63 (7.9)	241 (30.1)	266 (33.3)	158 (19.8)	43 (5.4)	12 (1.5)	2 (0.3)	800 (100.0)	237	1,037	145.97	22.88
30歳～ (%)	4 (0.0)	21 (0.2)	127 (1.1)	789 (7.0)	2,386 (21.2)	3,663 (32.6)	2,700 (24.0)	1,123 (10.0)	332 (3.0)	104 (0.9)	11,249 (100.0)	3,136	14,385	152.50	25.16
45歳～ (%)	7 (0.0)	79 (0.2)	534 (1.2)	2,657 (6.0)	9,111 (20.6)	14,472 (32.6)	11,233 (25.3)	4,684 (10.6)	1,267 (2.9)	287 (0.6)	44,331 (100.0)	12,237	56,568	153.30	24.53
60歳～ (%)	12 (0.0)	203 (0.2)	1,366 (1.2)	7,349 (6.6)	23,498 (21.1)	37,648 (33.9)	27,510 (24.8)	10,453 (9.4)	2,591 (2.3)	506 (0.5)	111,136 (100.0)	30,842	141,978	151.92	23.90
75歳～ (%)	14 (0.0)	113 (0.2)	1,178 (1.7)	6,264 (8.8)	16,986 (23.9)	23,583 (33.1)	15,839 (22.3)	5,647 (7.9)	1,270 (1.8)	250 (0.4)	71,144 (100.0)	19,853	90,997	148.74	24.05
90歳～ (%)	2 (0.1)	14 (0.4)	108 (2.8)	458 (11.7)	1,034 (26.5)	1,177 (30.2)	752 (19.3)	271 (6.9)	74 (1.9)	11 (0.3)	3,901 (100.0)	1,104	5,005	145.32	25.66
合計 (%)	40 (0.0)	433 (0.2)	3,338 (1.4)	17,606 (7.3)	53,271 (22.0)	80,818 (33.3)	58,192 (24.0)	22,223 (9.2)	5,546 (2.3)	1,160 (0.5)	242,627 (100.0)	67,460	310,087	151.13	24.23
不明 (%)				1 (11.1)		4 (44.4)	3 (33.3)	1 (11.1)			9 (100.0)	12	21	155.56	23.28
記載なし (%)															
総計 (%)	40 (0.0)	433 (0.2)	3,338 (1.4)	17,607 (7.3)	53,271 (22.0)	80,822 (33.3)	58,195 (24.0)	22,224 (9.2)	5,546 (2.3)	1,160 (0.5)	242,636 (100.0)	67,472	310,108	151.13	24.23
平均	66.75	67.11	69.22	69.18	68.21	67.57	66.99	66.33	65.43	63.98	67.53	67.57	67.54		
標準偏差	16.80	13.18	13.50	13.11	12.70	12.28	12.19	12.26	12.42	13.03	12.47	12.58	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査