

表 3796 透析前収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	16 (0.0)	192 (0.3)	1,269 (1.7)	6,257 (8.2)	18,658 (24.6)	26,511 (35.0)	16,640 (21.9)	5,128 (6.8)	985 (1.3)	192 (0.3)	75,848 (100.0)	21,122	96,970	147.79	23.10
慢性腎盂腎炎 （％）	1 (0.0)	10 (0.4)	60 (2.5)	262 (11.0)	591 (24.9)	795 (33.4)	485 (20.4)	137 (5.8)	29 (1.2)	8 (0.3)	2,378 (100.0)	664	3,042	145.44	24.23
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		3 (0.2)	20 (1.0)	170 (8.6)	502 (25.4)	705 (35.7)	418 (21.2)	124 (6.3)	26 (1.3)	5 (0.3)	1,973 (100.0)	521	2,494	147.67	22.39
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		5 (0.4)	35 (2.7)	116 (9.0)	326 (25.2)	424 (32.8)	288 (22.3)	83 (6.4)	13 (1.0)	3 (0.2)	1,293 (100.0)	321	1,614	146.36	24.08
その他の分類不 能の腎炎 （％）		2 (0.2)	25 (2.3)	111 (10.2)	279 (25.6)	386 (35.4)	213 (19.6)	60 (5.5)	8 (0.7)	5 (0.5)	1,089 (100.0)	284	1,373	145.52	23.31
多発性嚢胞腎 （％）	2 (0.0)	14 (0.2)	136 (1.5)	820 (9.3)	2,428 (27.6)	3,159 (35.9)	1,717 (19.5)	435 (4.9)	84 (1.0)	5 (0.1)	8,800 (100.0)	2,206	11,006	145.33	21.73
腎硬化症 （％）	1 (0.0)	17 (0.1)	311 (1.4)	1,900 (8.5)	5,411 (24.1)	7,784 (34.6)	4,963 (22.1)	1,644 (7.3)	383 (1.7)	59 (0.3)	22,473 (100.0)	5,825	28,298	148.63	23.29
悪性高血圧 （％）			21 (1.1)	129 (6.6)	420 (21.5)	654 (33.5)	484 (24.8)	195 (10.0)	43 (2.2)	8 (0.4)	1,954 (100.0)	619	2,573	152.17	23.40
糖尿病性腎症 （％）	8 (0.0)	84 (0.1)	751 (0.8)	4,628 (5.0)	16,087 (17.4)	29,206 (31.5)	25,663 (27.7)	11,926 (12.9)	3,478 (3.8)	767 (0.8)	92,598 (100.0)	25,483	118,081	156.77	24.57
SLE腎炎 （％）		7 (0.4)	31 (1.8)	167 (9.6)	446 (25.6)	580 (33.3)	356 (20.4)	128 (7.3)	24 (1.4)	3 (0.2)	1,742 (100.0)	494	2,236	146.76	23.88
アミロイド腎 （％）		4 (1.1)	16 (4.4)	49 (13.5)	88 (24.2)	104 (28.7)	69 (19.0)	25 (6.9)	7 (1.9)	1 (0.3)	363 (100.0)	88	451	143.61	27.87
痛風腎 （％）		3 (0.3)	14 (1.6)	78 (8.8)	220 (24.7)	312 (35.1)	177 (19.9)	73 (8.2)	13 (1.5)		890 (100.0)	223	1,113	147.68	23.56
先天性代謝異常 による腎不全 （％）	1 (0.5)		11 (5.3)	22 (10.6)	58 (28.0)	63 (30.4)	36 (17.4)	14 (6.8)	2 (1.0)		207 (100.0)	65	272	142.46	25.29
腎・尿路結核 （％）		2 (1.3)	5 (3.3)	21 (13.8)	44 (28.9)	38 (25.0)	33 (21.7)	6 (3.9)	3 (2.0)		152 (100.0)	54	206	141.66	25.37
腎・尿路結石 （％）	1 (0.2)	3 (0.7)	11 (2.4)	45 (9.8)	120 (26.3)	161 (35.2)	87 (19.0)	28 (6.1)		1 (0.2)	457 (100.0)	124	581	144.77	23.23
腎・尿路腫瘍 （％）	1 (0.1)		8 (1.1)	62 (8.6)	176 (24.4)	241 (33.4)	167 (23.1)	56 (7.8)	7 (1.0)	4 (0.6)	722 (100.0)	164	886	148.58	22.85
閉塞性尿路障害 （％）		2 (0.4)	12 (2.2)	54 (9.8)	133 (24.2)	197 (35.9)	104 (18.9)	35 (6.4)	7 (1.3)	5 (0.9)	549 (100.0)	174	723	146.74	24.30
骨髄腫 （％）		1 (0.5)	10 (4.7)	30 (14.2)	73 (34.6)	56 (26.5)	35 (16.6)	4 (1.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	211 (100.0)	65	276	138.82	24.33
腎形成不全 （％）		2 (0.4)	15 (2.9)	76 (14.8)	145 (28.3)	154 (30.0)	86 (16.8)	25 (4.9)	8 (1.6)	2 (0.4)	513 (100.0)	136	649	142.23	25.15
不明 （％）	3 (0.0)	51 (0.2)	413 (2.0)	1,853 (8.9)	5,122 (24.6)	6,844 (32.8)	4,586 (22.0)	1,569 (7.5)	337 (1.6)	66 (0.3)	20,844 (100.0)	6,700	27,544	148.02	24.08
再導入 （％）	2 (0.1)	5 (0.3)	35 (2.0)	175 (10.0)	431 (24.6)	584 (33.4)	388 (22.2)	110 (6.3)	17 (1.0)	4 (0.2)	1,751 (100.0)	412	2,163	146.35	23.49
その他 （％）	4 (0.1)	26 (0.4)	129 (2.2)	582 (10.0)	1,513 (26.0)	1,864 (32.0)	1,200 (20.6)	419 (7.2)	71 (1.2)	21 (0.4)	5,829 (100.0)	1,728	7,557	146.41	24.61
合計 （％）	40 (0.0)	433 (0.2)	3,338 (1.4)	17,607 (7.3)	53,271 (22.0)	80,822 (33.3)	58,195 (24.0)	22,224 (9.2)	5,546 (2.3)	1,160 (0.5)	242,636 (100.0)	67,472	310,108	151.13	24.23
記載なし （％）															
総計 （％）	40 (0.0)	433 (0.2)	3,338 (1.4)	17,607 (7.3)	53,271 (22.0)	80,822 (33.3)	58,195 (24.0)	22,224 (9.2)	5,546 (2.3)	1,160 (0.5)	242,636 (100.0)	67,472	310,108	151.13	24.23

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査