

表 3801 透析前収縮期血圧(mmHg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	14	138	1,290	7,809	26,132	41,861	30,767	11,761	2,868	535	123,175	23,858	147,033	152.20	23.54
(%)	(0.0)	(0.1)	(1.0)	(6.3)	(21.2)	(34.0)	(25.0)	(9.5)	(2.3)	(0.4)	(100.0)				
女性	21	133	1,087	5,346	15,444	22,342	16,076	6,241	1,647	359	68,696	13,242	81,938	150.63	24.81
(%)	(0.0)	(0.2)	(1.6)	(7.8)	(22.5)	(32.5)	(23.4)	(9.1)	(2.4)	(0.5)	(100.0)				
合計	35	271	2,377	13,155	41,576	64,203	46,843	18,002	4,515	894	191,871	37,100	228,971	151.64	24.02
(%)	(0.0)	(0.1)	(1.2)	(6.9)	(21.7)	(33.5)	(24.4)	(9.4)	(2.4)	(0.5)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	35	271	2,377	13,155	41,576	64,203	46,843	18,002	4,515	894	191,871	37,100	228,971	151.64	24.02
(%)	(0.0)	(0.1)	(1.2)	(6.9)	(21.7)	(33.5)	(24.4)	(9.4)	(2.4)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査