

表 3802 透析前収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				1 (9.1)	5 (45.5)	4 (36.4)		1 (9.1)			11 (100.0)	1	12	140.36	17.92
15歳～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	7 (1.3)	34 (6.2)	164 (30.1)	188 (34.5)	109 (20.0)	30 (5.5)	10 (1.8)	1 (0.2)	545 (100.0)	112	657	146.93	22.54
30歳～ (%)	3 (0.0)	11 (0.1)	84 (1.0)	515 (6.3)	1,692 (20.7)	2,680 (32.8)	1,977 (24.2)	864 (10.6)	266 (3.3)	71 (0.9)	8,163 (100.0)	1,639	9,802	153.31	25.01
45歳～ (%)	5 (0.0)	49 (0.1)	372 (1.1)	1,827 (5.5)	6,610 (20.0)	10,808 (32.6)	8,601 (26.0)	3,643 (11.0)	995 (3.0)	220 (0.7)	33,130 (100.0)	6,455	39,585	154.05	24.38
60歳～ (%)	10 (0.0)	123 (0.1)	922 (1.1)	5,407 (6.2)	18,144 (20.8)	29,659 (33.9)	22,131 (25.3)	8,491 (9.7)	2,143 (2.5)	390 (0.4)	87,420 (100.0)	16,958	104,378	152.59	23.67
75歳～ (%)	14 (0.0)	74 (0.1)	908 (1.5)	5,003 (8.4)	14,086 (23.7)	19,859 (33.5)	13,383 (22.6)	4,745 (8.0)	1,041 (1.8)	201 (0.3)	59,314 (100.0)	11,318	70,632	149.05	23.82
90歳～ (%)	2 (0.1)	13 (0.4)	84 (2.6)	367 (11.2)	875 (26.7)	1,001 (30.5)	639 (19.5)	228 (7.0)	60 (1.8)	11 (0.3)	3,280 (100.0)	609	3,889	145.62	25.50
合計 (%)	35 (0.0)	271 (0.1)	2,377 (1.2)	13,154 (6.9)	41,576 (21.7)	64,199 (33.5)	46,840 (24.4)	18,002 (9.4)	4,515 (2.4)	894 (0.5)	191,863 (100.0)	37,092	228,955	151.64	24.02
不明 (%)				1 (12.5)		4 (50.0)	3 (37.5)				8 (100.0)	8	16	150.75	19.54
記載なし (%)															
総計 (%)	35 (0.0)	271 (0.1)	2,377 (1.2)	13,155 (6.9)	41,576 (21.7)	64,203 (33.5)	46,843 (24.4)	18,002 (9.4)	4,515 (2.4)	894 (0.5)	191,871 (100.0)	37,100	228,971	151.64	24.02
平均	67.89	68.07	70.18	70.13	68.91	68.15	67.51	66.73	65.58	64.57	68.11	67.96	68.08		
標準偏差	16.80	12.94	12.93	12.62	12.53	12.18	12.07	12.18	12.39	13.01	12.32	12.32	12.32		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査