

表 3804 透析前収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	13 (0.0)	112 (0.2)	869 (1.5)	4,422 (7.7)	13,944 (24.3)	20,161 (35.1)	12,910 (22.5)	4,017 (7.0)	778 (1.4)	149 (0.3)	57,375 (100.0)	11,202	68,577	148.43	22.90
慢性腎盂腎炎 （％）		4 (0.2)	39 (2.2)	185 (10.4)	435 (24.5)	596 (33.6)	377 (21.3)	105 (5.9)	26 (1.5)	6 (0.3)	1,773 (100.0)	392	2,165	146.60	23.94
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		1 (0.1)	13 (0.8)	125 (8.0)	386 (24.7)	572 (36.5)	337 (21.5)	107 (6.8)	20 (1.3)	4 (0.3)	1,565 (100.0)	269	1,834	148.51	22.13
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		2 (0.2)	22 (2.5)	66 (7.5)	222 (25.2)	308 (35.0)	189 (21.5)	57 (6.5)	11 (1.3)	3 (0.3)	880 (100.0)	184	1,064	147.18	23.67
その他の分類不 能の腎炎 （％）			20 (2.5)	78 (9.7)	202 (25.1)	278 (34.5)	176 (21.9)	43 (5.3)	6 (0.7)	2 (0.2)	805 (100.0)	144	949	146.07	23.04
多発性嚢胞腎 （％）	2 (0.0)	11 (0.2)	96 (1.4)	617 (8.9)	1,909 (27.4)	2,540 (36.4)	1,371 (19.7)	355 (5.1)	65 (0.9)	4 (0.1)	6,970 (100.0)	1,228	8,198	145.72	21.52
腎硬化症 （％）	1 (0.0)	12 (0.1)	224 (1.2)	1,519 (8.3)	4,401 (24.0)	6,333 (34.6)	4,099 (22.4)	1,369 (7.5)	307 (1.7)	48 (0.3)	18,313 (100.0)	3,147	21,460	148.91	23.16
悪性高血圧 （％）			19 (1.3)	99 (6.6)	308 (20.4)	507 (33.6)	380 (25.1)	154 (10.2)	39 (2.6)	5 (0.3)	1,511 (100.0)	370	1,881	152.51	23.71
糖尿病性腎症 （％）	8 (0.0)	56 (0.1)	575 (0.8)	3,685 (4.8)	13,104 (17.2)	24,128 (31.7)	21,194 (27.9)	9,837 (12.9)	2,872 (3.8)	591 (0.8)	76,050 (100.0)	14,457	90,507	156.90	24.37
SLE腎炎 （％）		4 (0.3)	18 (1.4)	130 (10.0)	334 (25.8)	432 (33.3)	266 (20.5)	98 (7.6)	13 (1.0)	2 (0.2)	1,297 (100.0)	253	1,550	146.90	23.50
アミロイド腎 （％）		4 (1.4)	11 (3.9)	37 (13.2)	68 (24.3)	84 (30.0)	49 (17.5)	22 (7.9)	4 (1.4)	1 (0.4)	280 (100.0)	45	325	143.40	27.75
痛風腎 （％）		1 (0.1)	12 (1.7)	62 (8.8)	162 (23.1)	253 (36.0)	140 (19.9)	62 (8.8)	10 (1.4)		702 (100.0)	126	828	148.18	23.53
先天性代謝異常 による腎不全 （％）	1 (0.7)		7 (4.8)	13 (8.8)	44 (29.9)	43 (29.3)	29 (19.7)	9 (6.1)	1 (0.7)		147 (100.0)	30	177	142.73	24.66
腎・尿路結核 （％）		1 (0.8)	4 (3.3)	16 (13.1)	37 (30.3)	27 (22.1)	29 (23.8)	5 (4.1)	3 (2.5)		122 (100.0)	36	158	142.76	25.48
腎・尿路結石 （％）	1 (0.3)	3 (0.8)	6 (1.7)	33 (9.1)	93 (25.8)	133 (36.8)	67 (18.6)	24 (6.6)		1 (0.3)	361 (100.0)	69	430	145.58	22.95
腎・尿路腫瘍 （％）	1 (0.2)		5 (0.8)	47 (7.7)	153 (25.1)	211 (34.6)	141 (23.2)	41 (6.7)	7 (1.1)	3 (0.5)	609 (100.0)	77	686	148.65	22.14
閉塞性尿路障害 （％）		1 (0.2)	7 (1.6)	36 (8.4)	100 (23.4)	162 (37.9)	89 (20.8)	25 (5.8)	4 (0.9)	4 (0.9)	428 (100.0)	89	517	147.97	23.03
骨髄腫 （％）		1 (0.6)	10 (6.2)	21 (13.0)	52 (32.1)	43 (26.5)	30 (18.5)	4 (2.5)	1 (0.6)		162 (100.0)	28	190	138.90	24.09
腎形成不全 （％）		2 (0.6)	4 (1.1)	46 (12.9)	96 (26.9)	114 (31.9)	66 (18.5)	21 (5.9)	7 (2.0)	1 (0.3)	357 (100.0)	62	419	145.15	24.42
不明 （％）	2 (0.0)	30 (0.2)	301 (1.8)	1,384 (8.5)	4,040 (24.7)	5,376 (32.9)	3,696 (22.6)	1,218 (7.4)	268 (1.6)	50 (0.3)	16,365 (100.0)	3,760	20,125	148.39	23.80
再導入 （％）	2 (0.2)	4 (0.3)	20 (1.6)	116 (9.4)	300 (24.4)	417 (33.9)	271 (22.0)	83 (6.7)	14 (1.1)	3 (0.2)	1,230 (100.0)	187	1,417	147.12	23.62
その他 （％）	4 (0.1)	22 (0.5)	95 (2.1)	418 (9.1)	1,186 (26.0)	1,485 (32.5)	937 (20.5)	346 (7.6)	59 (1.3)	17 (0.4)	4,569 (100.0)	945	5,514	147.01	24.49
合計 （％）	35 (0.0)	271 (0.1)	2,377 (1.2)	13,155 (6.9)	41,576 (21.7)	64,203 (33.5)	46,843 (24.4)	18,002 (9.4)	4,515 (2.4)	894 (0.5)	191,871 (100.0)	37,100	228,971	151.64	24.02
記載なし （％）															
総計 （％）	35 (0.0)	271 (0.1)	2,377 (1.2)	13,155 (6.9)	41,576 (21.7)	64,203 (33.5)	46,843 (24.4)	18,002 (9.4)	4,515 (2.4)	894 (0.5)	191,871 (100.0)	37,100	228,971	151.64	24.02

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査