

表 3810 透析前収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)	1	2	190.00	
15歳～ (%)			1 (0.7)	10 (7.1)	34 (24.1)	51 (36.2)	35 (24.8)	8 (5.7)	1 (0.7)	1 (0.7)	141 (100.0)	21	162	149.79	21.61
30歳～ (%)		4 (0.2)	22 (1.0)	169 (7.7)	480 (21.9)	688 (31.3)	553 (25.2)	201 (9.2)	50 (2.3)	28 (1.3)	2,195 (100.0)	293	2,488	152.26	25.06
45歳～ (%)	1 (0.0)	22 (0.3)	112 (1.4)	556 (6.9)	1,717 (21.3)	2,601 (32.3)	1,960 (24.3)	799 (9.9)	220 (2.7)	62 (0.8)	8,050 (100.0)	1,123	9,173	152.28	25.12
60歳～ (%)	1 (0.0)	63 (0.4)	294 (1.8)	1,244 (7.4)	3,544 (21.2)	5,612 (33.5)	4,017 (24.0)	1,496 (8.9)	368 (2.2)	90 (0.5)	16,729 (100.0)	2,285	19,014	150.85	24.73
75歳～ (%)		25 (0.3)	176 (2.3)	773 (10.1)	1,794 (23.4)	2,398 (31.2)	1,678 (21.8)	625 (8.1)	176 (2.3)	35 (0.5)	7,680 (100.0)	1,074	8,754	148.35	25.39
90歳～ (%)		1 (0.3)	10 (3.2)	48 (15.6)	70 (22.7)	83 (26.9)	65 (21.1)	24 (7.8)	7 (2.3)		308 (100.0)	42	350	144.92	27.16
合計 (%)	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,839	39,943	150.67	25.04
不明 (%)												3	3		
記載なし (%)															
総計 (%)	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,842	39,946	150.67	25.04
平均	65.50	66.70	67.97	66.48	65.32	64.89	64.43	64.13	64.38	60.94	64.96	65.12	64.98		
標準偏差	12.02	11.05	11.91	12.96	12.59	12.17	12.23	12.18	12.20	12.69	12.36	12.48	12.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査