

表 3812 透析前収縮期血圧(mmHg) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	2 (0.0)	64 (0.5)	272 (2.1)	1,225 (9.3)	3,256 (24.8)	4,523 (34.4)	2,772 (21.1)	831 (6.3)	167 (1.3)	36 (0.3)	13,148 (100.0)	1,928	15,076	146.68	23.74
慢性腎盂腎炎 （％）		2 (0.5)	10 (2.7)	41 (11.0)	91 (24.5)	132 (35.5)	72 (19.4)	21 (5.6)	2 (0.5)	1 (0.3)	372 (100.0)	50	422	144.52	23.44
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		2 (0.8)	6 (2.3)	22 (8.5)	61 (23.6)	90 (34.9)	62 (24.0)	10 (3.9)	4 (1.6)	1 (0.4)	258 (100.0)	26	284	146.41	23.52
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		3 (0.9)	10 (3.1)	38 (11.8)	77 (23.8)	94 (29.1)	78 (24.1)	21 (6.5)	2 (0.6)		323 (100.0)	36	359	145.37	25.10
その他の分類不 能の腎炎 （％）		2 (1.1)	2 (1.1)	16 (9.2)	44 (25.3)	67 (38.5)	27 (15.5)	12 (6.9)	1 (0.6)	3 (1.7)	174 (100.0)	21	195	146.58	25.45
多発性嚢胞腎 （％）		1 (0.1)	30 (2.3)	141 (11.0)	353 (27.6)	435 (34.0)	248 (19.4)	61 (4.8)	12 (0.9)		1,281 (100.0)	183	1,464	144.33	22.42
腎硬化症 （％）		2 (0.1)	57 (2.2)	214 (8.4)	579 (22.7)	870 (34.0)	583 (22.8)	184 (7.2)	59 (2.3)	8 (0.3)	2,556 (100.0)	330	2,886	149.10	24.22
悪性高血圧 （％）			1 (0.4)	17 (6.0)	69 (24.5)	101 (35.8)	64 (22.7)	25 (8.9)	3 (1.1)	2 (0.7)	282 (100.0)	30	312	151.52	21.81
糖尿病性腎症 （％）		18 (0.2)	111 (1.0)	586 (5.0)	1,924 (16.5)	3,469 (29.8)	3,311 (28.4)	1,594 (13.7)	486 (4.2)	146 (1.3)	11,645 (100.0)	1,528	13,173	157.98	25.52
SLE腎炎 （％）		3 (0.9)	11 (3.4)	26 (8.1)	74 (23.0)	105 (32.6)	67 (20.8)	25 (7.8)	10 (3.1)	1 (0.3)	322 (100.0)	41	363	147.28	26.19
アミロイド腎 （％）			3 (5.4)	9 (16.1)	17 (30.4)	11 (19.6)	14 (25.0)		2 (3.6)		56 (100.0)	3	59	141.75	26.53
痛風腎 （％）		2 (1.5)		11 (8.3)	41 (31.1)	41 (31.1)	27 (20.5)	8 (6.1)	2 (1.5)		132 (100.0)	22	154	146.08	23.77
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			2 (5.4)	3 (8.1)	11 (29.7)	9 (24.3)	6 (16.2)	5 (13.5)	1 (2.7)		37 (100.0)	7	44	147.89	27.68
腎・尿路結核 （％）		1 (4.8)	1 (4.8)	5 (23.8)	4 (19.0)	7 (33.3)	2 (9.5)	1 (4.8)			21 (100.0)	1	22	133.76	27.49
腎・尿路結石 （％）			3 (4.9)	4 (6.6)	16 (26.2)	19 (31.1)	16 (26.2)	3 (4.9)			61 (100.0)	8	69	146.10	24.81
腎・尿路腫瘍 （％）			3 (3.9)	9 (11.7)	16 (20.8)	20 (26.0)	17 (22.1)	11 (14.3)		1 (1.3)	77 (100.0)	8	85	148.60	26.79
閉塞性尿路障害 （％）			1 (1.6)	7 (10.9)	18 (28.1)	23 (35.9)	5 (7.8)	6 (9.4)	3 (4.7)	1 (1.6)	64 (100.0)	10	74	147.83	27.74
骨髄腫 （％）				5 (27.8)	6 (33.3)	6 (33.3)	1 (5.6)				18 (100.0)	1	19	133.72	20.51
腎形成不全 （％）			5 (5.7)	11 (12.6)	28 (32.2)	28 (32.2)	12 (13.8)	2 (2.3)		1 (1.1)	87 (100.0)	14	101	139.95	24.49
不明 （％）		12 (0.4)	63 (2.1)	278 (9.2)	663 (22.0)	1,018 (33.8)	652 (21.6)	262 (8.7)	55 (1.8)	11 (0.4)	3,014 (100.0)	466	3,480	148.86	24.69
再導入 （％）		1 (0.3)	7 (1.9)	45 (11.9)	90 (23.8)	115 (30.4)	93 (24.6)	23 (6.1)	3 (0.8)	1 (0.3)	378 (100.0)	38	416	145.91	23.36
その他 （％）		2 (0.3)	17 (2.1)	87 (10.9)	201 (25.2)	250 (31.3)	179 (22.4)	49 (6.1)	10 (1.3)	3 (0.4)	798 (100.0)	91	889	146.52	24.39
合計 （％）	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,842	39,946	150.67	25.04
記載なし （％）															
総計 （％）	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,842	39,946	150.67	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査