

表 3813 透析前収縮期血圧(mmHg) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		1	4	8	9	12	3	2			39	3	42	132.79	25.82
(%)		(2.6)	(10.3)	(20.5)	(23.1)	(30.8)	(7.7)	(5.1)			(100.0)				
私立大学		2	4	16	41	54	35	8	3		163	10	173	144.81	25.02
(%)		(1.2)	(2.5)	(9.8)	(25.2)	(33.1)	(21.5)	(4.9)	(1.8)		(100.0)				
国立			1	4	8	8	8	3			32	4	36	147.38	24.20
(%)			(3.1)	(12.5)	(25.0)	(25.0)	(25.0)	(9.4)			(100.0)				
県市町村立		8	32	142	346	509	344	143	47	9	1,580	193	1,773	150.17	26.13
(%)		(0.5)	(2.0)	(9.0)	(21.9)	(32.2)	(21.8)	(9.1)	(3.0)	(0.6)	(100.0)				
社会保険		3	8	30	75	98	56	21	4	3	298	21	319	146.18	26.37
(%)		(1.0)	(2.7)	(10.1)	(25.2)	(32.9)	(18.8)	(7.0)	(1.3)	(1.0)	(100.0)				
厚生連		4	17	72	219	284	222	81	22	7	928	85	1,013	150.42	25.57
(%)		(0.4)	(1.8)	(7.8)	(23.6)	(30.6)	(23.9)	(8.7)	(2.4)	(0.8)	(100.0)				
その他公的		4	17	66	119	192	123	64	12	6	603	91	694	148.94	27.58
(%)		(0.7)	(2.8)	(10.9)	(19.7)	(31.8)	(20.4)	(10.6)	(2.0)	(1.0)	(100.0)				
私立総合		1	12	76	233	325	253	101	20	12	1,033	60	1,093	151.94	24.75
(%)		(0.1)	(1.2)	(7.4)	(22.6)	(31.5)	(24.5)	(9.8)	(1.9)	(1.2)	(100.0)				
私立	1	33	177	762	1,903	2,760	2,048	746	174	48	8,652	1,363	10,015	149.69	25.16
(%)	(0.0)	(0.4)	(2.0)	(8.8)	(22.0)	(31.9)	(23.7)	(8.6)	(2.0)	(0.6)	(100.0)				
私立診療所	1	59	343	1,624	4,686	7,191	5,216	1,985	540	131	21,776	3,012	24,788	151.23	24.78
(%)	(0.0)	(0.3)	(1.6)	(7.5)	(21.5)	(33.0)	(24.0)	(9.1)	(2.5)	(0.6)	(100.0)				
総計	2	115	615	2,800	7,639	11,433	8,308	3,154	822	216	35,104	4,842	39,946	150.67	25.04
(%)	(0.0)	(0.3)	(1.8)	(8.0)	(21.8)	(32.6)	(23.7)	(9.0)	(2.3)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査