

表 3814 透析前収縮期血圧(mmHg) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (10.0)	2 (20.0)	5 (50.0)	2 (20.0)				10 (100.0)	2	12	146.50	16.67
20～ (%)		2 (2.9)	2 (2.9)	8 (11.8)	12 (17.6)	23 (33.8)	13 (19.1)	6 (8.8)	2 (2.9)		68 (100.0)	8	76	144.47	28.24
30～ (%)		17 (0.7)	90 (3.8)	243 (10.2)	539 (22.6)	735 (30.8)	520 (21.8)	188 (7.9)	45 (1.9)	12 (0.5)	2,389 (100.0)	293	2,682	146.73	26.70
40～ (%)	1 (0.0)	36 (0.4)	190 (2.1)	884 (9.8)	2,110 (23.5)	2,922 (32.5)	1,895 (21.1)	711 (7.9)	187 (2.1)	47 (0.5)	8,983 (100.0)	1,022	10,005	148.18	25.23
50～ (%)	1 (0.0)	33 (0.3)	204 (1.8)	886 (7.9)	2,527 (22.5)	3,677 (23.7)	2,630 (23.4)	965 (8.6)	260 (2.3)	60 (0.5)	11,243 (100.0)	1,247	12,490	150.35	24.81
60～ (%)		17 (0.2)	81 (1.1)	498 (6.6)	1,571 (20.9)	2,538 (33.8)	1,875 (25.0)	710 (9.5)	173 (2.3)	43 (0.6)	7,506 (100.0)	859	8,365	152.15	24.00
70～ (%)		7 (0.2)	30 (1.0)	182 (6.0)	589 (19.3)	987 (32.3)	822 (26.9)	331 (10.8)	83 (2.7)	25 (0.8)	3,056 (100.0)	367	3,423	154.32	24.47
80～ (%)			13 (1.1)	63 (5.5)	186 (16.1)	352 (30.5)	335 (29.1)	145 (12.6)	42 (3.6)	17 (1.5)	1,153 (100.0)	120	1,273	157.19	25.35
90～ (%)			2 (0.5)	19 (4.5)	65 (15.4)	121 (28.7)	123 (29.2)	65 (15.4)	21 (5.0)	5 (1.2)	421 (100.0)	34	455	160.23	25.10
100～ (%)		2 (1.6)	2 (1.6)	2 (1.6)	16 (12.4)	37 (28.7)	43 (33.3)	17 (13.2)	5 (3.9)	5 (3.9)	129 (100.0)	13	142	160.80	27.11
110～ (%)				6 (10.5)	9 (15.8)	12 (21.1)	22 (38.6)	5 (8.8)	2 (3.5)	1 (1.8)	57 (100.0)	4	61	156.47	25.91
120～ (%)				3 (8.6)	2 (5.7)	9 (25.7)	11 (31.4)	8 (22.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	35 (100.0)	2	37	164.51	26.57
合計 (%)	2 (0.0)	114 (0.3)	614 (1.8)	2,795 (8.0)	7,628 (21.8)	11,418 (32.6)	8,291 (23.7)	3,151 (9.0)	821 (2.3)	216 (0.6)	35,050 (100.0)	3,971	39,021	150.67	25.04
記載なし (%)		1 (1.9)	1 (1.9)	5 (9.3)	11 (20.4)	15 (27.8)	17 (31.5)	3 (5.6)	1 (1.9)		54 (100.0)	871	925	147.93	26.02
総計 (%)	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,842	39,946	150.67	25.04
平均	45.95	52.14	51.96	54.28	55.57	56.61	57.87	58.52	58.70	61.03	56.65	56.43	56.63		
標準偏差	5.87	13.22	11.77	12.39	12.19	12.72	13.65	14.13	14.31	16.36	13.07	12.71	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査