

表 3817 収縮期血圧(mmHg) 性別（腹膜透析患者）

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)		5 (0.2)	73 (2.3)	379 (12.1)	936 (30.0)	1,068 (34.2)	484 (15.5)	151 (4.8)	22 (0.7)	4 (0.1)	3,122 (100.0)	2,620	5,742	142.24	22.66
女性 (%)	1 (0.1)	8 (0.5)	51 (2.9)	262 (15.1)	580 (33.5)	511 (29.5)	237 (13.7)	66 (3.8)	9 (0.5)	6 (0.3)	1,731 (100.0)	1,468	3,199	138.80	23.11
合計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
記載なし (%)															
総計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査