

表 3818 収縮期血圧(mmHg) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (2.0)	12 (23.5)	25 (49.0)	9 (17.6)	4 (7.8)					51 (100.0)	46	97	109.08	16.85
15歳～ (%)		1 (1.4)	4 (5.5)	16 (21.9)	32 (43.8)	12 (16.4)	5 (6.8)	2 (2.7)	1 (1.4)		73 (100.0)	38	111	131.00	24.06
30歳～ (%)	1 (0.2)		6 (1.5)	51 (12.7)	114 (28.4)	129 (32.1)	74 (18.4)	20 (5.0)	5 (1.2)	2 (0.5)	402 (100.0)	299	701	143.80	23.79
45歳～ (%)		2 (0.2)	17 (1.3)	129 (10.1)	366 (28.6)	427 (33.4)	240 (18.8)	85 (6.6)	11 (0.9)	2 (0.2)	1,279 (100.0)	1,023	2,302	145.24	22.74
60歳～ (%)		4 (0.2)	49 (2.3)	283 (13.0)	700 (32.2)	747 (34.3)	299 (13.7)	81 (3.7)	8 (0.4)	4 (0.2)	2,175 (100.0)	1,859	4,034	140.56	21.60
75歳～ (%)		5 (0.6)	31 (3.8)	128 (15.6)	279 (34.0)	245 (29.8)	96 (11.7)	29 (3.5)	6 (0.7)	2 (0.2)	821 (100.0)	770	1,591	137.61	23.59
90歳～ (%)			5 (9.6)	9 (17.3)	16 (30.8)	15 (28.8)	7 (13.5)				52 (100.0)	53	105	133.31	23.33
合計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
平均	34.00	59.77	60.30	61.39	62.71	62.47	60.66	60.39	60.45	60.70	61.96	63.03	62.45		
標準偏差		24.84	23.82	18.11	14.33	12.82	12.91	12.29	16.04	16.31	14.53	14.52	14.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査