

表 3819 収縮期血圧(mmHg) 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	1 (0.1)	9 (0.5)	50 (2.7)	241 (12.8)	640 (34.0)	594 (31.6)	252 (13.4)	87 (4.6)	5 (0.3)	3 (0.2)	1,882 (100.0)	1,718	3,600	139.90	22.58
2年～ (%)		3 (0.2)	36 (2.1)	219 (12.8)	509 (29.9)	576 (33.8)	269 (15.8)	69 (4.0)	20 (1.2)	4 (0.2)	1,705 (100.0)	1,496	3,201	142.05	22.97
5年～ (%)			27 (2.8)	140 (14.4)	285 (29.4)	314 (32.4)	145 (15.0)	51 (5.3)	4 (0.4)	3 (0.3)	969 (100.0)	688	1,657	141.37	23.12
10年～ (%)			6 (2.9)	26 (12.6)	59 (28.6)	68 (33.0)	40 (19.4)	6 (2.9)	1 (0.5)		206 (100.0)	134	340	142.07	21.78
15年～ (%)			1 (1.6)	11 (17.2)	16 (25.0)	20 (31.3)	12 (18.8)	3 (4.7)	1 (1.6)		64 (100.0)	33	97	142.52	24.09
20年～ (%)			1 (9.1)	1 (9.1)	3 (27.3)	4 (36.4)	1 (9.1)	1 (9.1)			11 (100.0)	9	20	136.18	27.58
25年～ (%)		1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)		1 (16.7)				6 (100.0)	2	8	110.00	31.38
30年～ (%)			2 (25.0)	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)	1 (12.5)				8 (100.0)	2	10	125.38	25.26
35年～ (%)						2 (100.0)					2 (100.0)	1	3	149.50	0.71
40年～ (%)															
合計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,083	8,936	141.01	22.88
不明 (%)												5	5		
記載なし (%)															
総計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
平均		2.92	4.02	3.49	3.04	3.28	3.49	3.16	3.65	2.50	3.28	2.89	3.10		
標準偏差		7.60	5.51	3.97	3.58	3.68	3.72	3.33	3.61	2.12	3.75	3.31	3.56		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査