

表 3822 収縮期血圧(mmHg) 体重(kg)別 (腹膜透析患者)

体重	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (2.8)	10 (27.8)	22 (61.1)	3 (8.3)						36 (100.0)	2	38	102.78	12.29
20～ (%)			3 (14.3)	10 (47.6)	5 (23.8)	3 (14.3)					21 (100.0)	2	23	116.48	15.77
30～ (%)	1 (0.7)	3 (2.1)	12 (8.5)	33 (23.2)	53 (37.3)	28 (19.7)	9 (6.3)	3 (2.1)			142 (100.0)	30	172	127.07	24.00
40～ (%)		5 (0.7)	31 (4.2)	124 (16.8)	270 (36.5)	197 (26.6)	82 (11.1)	28 (3.8)	3 (0.4)		740 (100.0)	164	904	135.62	22.83
50～ (%)		1 (0.1)	32 (2.4)	190 (14.1)	423 (31.4)	470 (34.9)	174 (12.9)	46 (3.4)	9 (0.7)	2 (0.1)	1,347 (100.0)	244	1,591	140.19	21.90
60～ (%)		2 (0.1)	21 (1.5)	160 (11.5)	461 (33.1)	445 (32.0)	222 (15.9)	68 (4.9)	7 (0.5)	6 (0.4)	1,392 (100.0)	224	1,616	142.62	22.24
70～ (%)		1 (0.1)	11 (1.6)	60 (8.8)	185 (27.2)	245 (36.0)	133 (19.6)	38 (5.6)	5 (0.7)	2 (0.3)	680 (100.0)	131	811	145.98	22.26
80～ (%)				20 (7.9)	65 (25.7)	100 (39.5)	49 (19.4)	16 (6.3)	3 (1.2)		253 (100.0)	45	298	147.76	21.40
90～ (%)			1 (1.1)	6 (6.4)	13 (13.8)	35 (37.2)	27 (28.7)	11 (11.7)	1 (1.1)		94 (100.0)	10	104	152.56	21.26
100～ (%)				1 (6.3)	4 (25.0)	6 (37.5)	2 (12.5)	2 (12.5)	1 (6.3)		16 (100.0)	4	20	154.75	24.42
110～ (%)					1 (12.5)	5 (62.5)	1 (12.5)	1 (12.5)			8 (100.0)	2	10	154.50	19.16
120～ (%)					1 (16.7)	4 (66.7)		1 (16.7)			6 (100.0)	3	9	153.00	23.34
合計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	121 (2.6)	626 (13.2)	1,484 (31.3)	1,538 (32.5)	699 (14.8)	214 (4.5)	29 (0.6)	10 (0.2)	4,735 (100.0)	861	5,596	140.98	22.90
記載なし (%)			3 (2.5)	15 (12.7)	32 (27.1)	41 (34.7)	22 (18.6)	3 (2.5)	2 (1.7)		118 (100.0)	3,227	3,345	142.29	21.94
総計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
平均	31.40	46.89	49.87	55.68	59.64	62.77	64.21	65.36	65.96	64.05	60.82	60.32	60.74		
標準偏差		16.75	17.18	14.87	12.46	13.45	12.92	14.83	14.61	7.00	13.87	14.04	13.90		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査