

表 3823 収縮期血圧(mmHg) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (100.0)					1 (100.0)		1	140.00	
20～ (%)	1 (6.7)	4 (26.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	3 (20.0)	4 (26.7)	1 (6.7)				15 (100.0)		15	111.87	37.37
40～ (%)		9 (2.4)	72 (19.2)	135 (36.0)	107 (28.5)	43 (11.5)	8 (2.1)	1 (0.3)			375 (100.0)		375	115.99	20.81
60～ (%)			49 (2.4)	426 (20.6)	868 (42.0)	567 (27.5)	127 (6.2)	25 (1.2)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,065 (100.0)		2,065	132.76	18.54
80～ (%)				64 (4.9)	402 (31.0)	562 (43.4)	217 (16.7)	44 (3.4)	6 (0.5)	1 (0.1)	1,296 (100.0)		1,296	145.93	17.61
90～ (%)				7 (1.0)	111 (15.5)	308 (43.1)	214 (30.0)	66 (9.2)	8 (1.1)		714 (100.0)		714	155.76	17.81
100～ (%)				1 (0.3)	21 (6.1)	84 (24.2)	148 (42.7)	74 (21.3)	13 (3.7)	6 (1.7)	347 (100.0)		347	168.22	19.16
120～ (%)						3 (17.6)	4 (23.5)	6 (35.3)	2 (11.8)	2 (11.8)	17 (100.0)	1	18	185.65	23.65
140～ (%)								1 (100.0)			1 (100.0)		1	196.00	
合計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	122 (2.5)	634 (13.1)	1,512 (31.3)	1,572 (32.5)	719 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,831 (100.0)	1	4,832	141.07	22.86
記載なし (%)			2 (9.1)	7 (31.8)	4 (18.2)	7 (31.8)	2 (9.1)				22 (100.0)	4,087	4,109	126.77	24.05
総計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
平均	39.00	43.77	57.33	67.29	75.14	81.74	89.59	95.33	100.26	108.20	79.00	126.00	79.01		
標準偏差		8.13	8.68	10.32	11.00	11.92	12.51	14.15	13.23	17.50	14.42		14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査