

表 3824 収縮期血圧(mmHg) 脈拍(拍/分)別(腹膜透析患者)

脈拍	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			2 (40.0)	1 (20.0)		1 (20.0)	1 (20.0)				5 (100.0)		5	122.20	32.39
40～ (%)				2 (8.0)	6 (24.0)	7 (28.0)	5 (20.0)	4 (16.0)		1 (4.0)	25 (100.0)		25	153.64	27.17
50～ (%)			4 (2.1)	23 (12.3)	57 (30.5)	61 (32.6)	29 (15.5)	9 (4.8)	4 (2.1)		187 (100.0)		187	142.96	23.46
60～ (%)		1 (0.1)	24 (2.8)	126 (14.8)	267 (31.4)	264 (31.1)	114 (13.4)	46 (5.4)	6 (0.7)	1 (0.1)	849 (100.0)	1	850	140.54	23.30
70～ (%)		3 (0.2)	24 (1.9)	153 (12.0)	412 (32.4)	429 (33.8)	196 (15.4)	48 (3.8)	6 (0.5)		1,271 (100.0)		1,271	141.11	21.57
80～ (%)			22 (2.1)	124 (12.1)	312 (30.5)	346 (33.8)	169 (16.5)	44 (4.3)	5 (0.5)	2 (0.2)	1,024 (100.0)		1,024	142.53	21.84
90～ (%)		5 (1.0)	11 (2.3)	69 (14.3)	129 (26.8)	154 (32.0)	79 (16.4)	25 (5.2)	6 (1.2)	3 (0.6)	481 (100.0)		481	142.32	25.25
100～ (%)	1 (0.5)		12 (5.9)	31 (15.2)	52 (25.5)	60 (29.4)	32 (15.7)	12 (5.9)	2 (1.0)	2 (1.0)	204 (100.0)		204	141.12	27.80
110～ (%)			2 (3.8)	10 (19.2)	16 (30.8)	14 (26.9)	8 (15.4)	2 (3.8)			52 (100.0)		52	137.75	23.93
120～ (%)			4 (20.0)	9 (45.0)	3 (15.0)	2 (10.0)	2 (10.0)				20 (100.0)		20	119.30	23.79
合計 (%)	1 (0.0)	9 (0.2)	105 (2.5)	548 (13.3)	1,254 (30.5)	1,338 (32.5)	635 (15.4)	190 (4.6)	29 (0.7)	9 (0.2)	4,118 (100.0)	1	4,119	141.48	23.04
記載なし (%)		4 (0.5)	19 (2.6)	93 (12.7)	262 (35.6)	241 (32.8)	86 (11.7)	27 (3.7)	2 (0.3)	1 (0.1)	735 (100.0)	4,087	4,822	138.40	21.81
総計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	124 (2.6)	641 (13.2)	1,516 (31.2)	1,579 (32.5)	721 (14.9)	217 (4.5)	31 (0.6)	10 (0.2)	4,853 (100.0)	4,088	8,941	141.01	22.88
平均	101.00	82.44	80.69	78.78	77.44	77.96	78.54	77.64	78.31	85.11	78.09	68.00	78.09		
標準偏差		13.52	18.14	14.84	12.57	12.58	13.19	14.01	14.52	19.21	13.27		13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査