

表 3825 透析前拡張期血圧(mmHg) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	71 (0.0)	646 (0.3)	17,149 (8.6)	93,525 (46.9)	48,769 (24.4)	25,897 (13.0)	12,580 (6.3)	771 (0.4)	62 (0.0)	199,470 (100.0)	56,171	255,641	77.52	14.39
血液透析濾過 (%)	7 (0.0)	124 (0.3)	2,764 (7.7)	15,409 (42.9)	9,242 (25.7)	5,462 (15.2)	2,757 (7.7)	172 (0.5)	12 (0.0)	35,949 (100.0)	7,334	43,283	79.14	14.69
血液濾過 (%)			3 (3.4)	44 (50.0)	22 (25.0)	14 (15.9)	5 (5.7)			88 (100.0)	4	92	78.88	12.12
血液吸着透析 (%)	1 (0.1)	10 (0.8)	151 (11.4)	714 (54.0)	273 (20.6)	118 (8.9)	53 (4.0)	3 (0.2)		1,323 (100.0)	307	1,630	73.90	14.14
在宅血液透析 (%)		1 (0.3)	38 (11.9)	121 (37.8)	85 (26.6)	46 (14.4)	29 (9.1)			320 (100.0)	201	521	78.73	15.04
腹膜透析 (%)	1 (0.0)	15 (0.3)	375 (7.8)	2,065 (42.7)	1,296 (26.8)	714 (14.8)	347 (7.2)	18 (0.4)	1 (0.0)	4,832 (100.0)	4,109	8,941	79.01	14.43
合計 (%)	80 (0.0)	796 (0.3)	20,480 (8.5)	111,878 (46.2)	59,687 (24.7)	32,251 (13.3)	15,771 (6.5)	964 (0.4)	75 (0.0)	241,982 (100.0)	68,126	310,108	77.77	14.45
記載なし (%)														
総計 (%)	80 (0.0)	796 (0.3)	20,480 (8.5)	111,878 (46.2)	59,687 (24.7)	32,251 (13.3)	15,771 (6.5)	964 (0.4)	75 (0.0)	241,982 (100.0)	68,126	310,108	77.77	14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査