

表 3835 透析前拡張期血圧(mmHg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	48 (0.0)	294 (0.2)	9,176 (7.5)	56,002 (45.6)	31,050 (25.3)	17,029 (13.9)	8,706 (7.1)	550 (0.4)	39 (0.0)	122,894 (100.0)	24,139	147,033	78.46	14.35
女性 (%)	19 (0.0)	318 (0.5)	7,181 (10.5)	33,623 (49.1)	15,790 (23.1)	7,919 (11.6)	3,436 (5.0)	191 (0.3)	18 (0.0)	68,495 (100.0)	13,443	81,938	75.94	14.31
合計 (%)	67 (0.0)	612 (0.3)	16,357 (8.5)	89,625 (46.8)	46,840 (24.5)	24,948 (13.0)	12,142 (6.3)	741 (0.4)	57 (0.0)	191,389 (100.0)	37,582	228,971	77.56	14.39
記載なし (%)														
総計 (%)	67 (0.0)	612 (0.3)	16,357 (8.5)	89,625 (46.8)	46,840 (24.5)	24,948 (13.0)	12,142 (6.3)	741 (0.4)	57 (0.0)	191,389 (100.0)	37,582	228,971	77.56	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査