

表 3842 透析前拡張期血圧(mmHg) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	4 (0.0)	55 (0.2)	1,433 (6.5)	9,067 (41.1)	5,838 (26.5)	3,586 (16.3)	1,937 (8.8)	130 (0.6)	9 (0.0)	22,059 (100.0)	3,135	25,194	80.26	14.66
女性 (%)	3 (0.0)	66 (0.5)	1,247 (9.6)	5,905 (45.7)	3,165 (24.5)	1,731 (13.4)	764 (5.9)	39 (0.3)	3 (0.0)	12,923 (100.0)	1,829	14,752	77.31	14.58
合計 (%)	7 (0.0)	121 (0.3)	2,680 (7.7)	14,972 (42.8)	9,003 (25.7)	5,317 (15.2)	2,701 (7.7)	169 (0.5)	12 (0.0)	34,982 (100.0)	4,964	39,946	79.17	14.70
記載なし (%)														
総計 (%)	7 (0.0)	121 (0.3)	2,680 (7.7)	14,972 (42.8)	9,003 (25.7)	5,317 (15.2)	2,701 (7.7)	169 (0.5)	12 (0.0)	34,982 (100.0)	4,964	39,946	79.17	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査