

表 3844 透析前拡張期血圧(mmHg) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	1 (0.0)	10 (0.2)	344 (8.0)	1,908 (44.2)	1,064 (24.6)	645 (14.9)	326 (7.5)	20 (0.5)	3 (0.1)	4,321 (100.0)	643	4,964	78.96	14.74
2年～ (%)	2 (0.0)	13 (0.2)	535 (7.1)	3,189 (42.0)	1,949 (25.7)	1,180 (15.6)	673 (8.9)	41 (0.5)	4 (0.1)	7,586 (100.0)	1,029	8,615	79.94	14.80
5年～ (%)	2 (0.0)	27 (0.3)	649 (7.3)	3,703 (41.9)	2,244 (25.4)	1,400 (15.8)	751 (8.5)	54 (0.6)	3 (0.0)	8,833 (100.0)	1,283	10,116	79.71	14.84
10年～ (%)	1 (0.0)	19 (0.3)	350 (6.4)	2,266 (41.6)	1,462 (26.8)	872 (16.0)	447 (8.2)	31 (0.6)		5,448 (100.0)	746	6,194	80.04	14.50
15年～ (%)	1 (0.0)	11 (0.3)	221 (6.4)	1,447 (41.8)	945 (27.3)	587 (16.9)	239 (6.9)	13 (0.4)	1 (0.0)	3,465 (100.0)	459	3,924	79.65	14.20
20年～ (%)		10 (0.4)	174 (7.6)	998 (43.5)	630 (27.5)	341 (14.9)	136 (5.9)	6 (0.3)		2,295 (100.0)	342	2,637	78.55	13.88
25年～ (%)		3 (0.2)	145 (10.1)	662 (46.0)	384 (26.7)	162 (11.3)	82 (5.7)	2 (0.1)		1,440 (100.0)	211	1,651	76.80	14.01
30年～ (%)		13 (1.4)	135 (14.3)	451 (47.7)	217 (22.9)	95 (10.0)	33 (3.5)	1 (0.1)	1 (0.1)	946 (100.0)	177	1,123	73.82	14.68
35年～ (%)		10 (1.9)	97 (18.3)	285 (53.9)	98 (18.5)	28 (5.3)	10 (1.9)	1 (0.2)		529 (100.0)	58	587	70.21	14.13
40年～ (%)		5 (4.5)	30 (26.8)	60 (53.6)	8 (7.1)	6 (5.4)	3 (2.7)			112 (100.0)	12	124	65.55	15.72
合計 (%)	7 (0.0)	121 (0.3)	2,680 (7.7)	14,969 (42.8)	9,001 (25.7)	5,316 (15.2)	2,700 (7.7)	169 (0.5)	12 (0.0)	34,975 (100.0)	4,960	39,935	79.17	14.70
不明 (%)				3 (42.9)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)			7 (100.0)	4	11	83.57	9.90
記載なし (%)														
総計 (%)	7 (0.0)	121 (0.3)	2,680 (7.7)	14,972 (42.8)	9,003 (25.7)	5,317 (15.2)	2,701 (7.7)	169 (0.5)	12 (0.0)	34,982 (100.0)	4,964	39,946	79.17	14.70
平均	6.57	15.99	11.57	10.25	9.97	9.31	8.62	7.70	6.83	10.01	10.09	10.02		
標準偏差	5.94	12.69	10.65	9.20	8.52	7.84	7.37	6.54	8.66	8.86	8.94	8.87		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査