

表 3845 透析前拡張期血圧(mmHg) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	4 (0.0)	53 (0.4)	939 (7.2)	5,469 (41.8)	3,530 (27.0)	2,063 (15.8)	946 (7.2)	71 (0.5)	2 (0.0)	13,077 (100.0)	1,999	15,076	79.37	14.55
慢性腎盂腎炎 （％）		3 (0.8)	30 (8.1)	154 (41.5)	99 (26.7)	55 (14.8)	30 (8.1)			371 (100.0)	51	422	78.60	14.32
急速進行性糸球体腎炎 （％）			20 (7.8)	119 (46.1)	63 (24.4)	39 (15.1)	17 (6.6)			258 (100.0)	26	284	78.22	13.97
妊娠腎/妊娠中毒症 （％）		1 (0.3)	37 (11.5)	138 (42.9)	79 (24.5)	47 (14.6)	20 (6.2)			322 (100.0)	37	359	77.59	15.08
その他の分類不能の腎炎 （％）		1 (0.6)	16 (9.2)	54 (31.2)	53 (30.6)	29 (16.8)	19 (11.0)	1 (0.6)		173 (100.0)	22	195	81.17	15.55
多発性嚢胞腎 （％）			73 (5.7)	543 (42.6)	365 (28.6)	214 (16.8)	79 (6.2)	2 (0.2)		1,276 (100.0)	188	1,464	79.59	12.92
腎硬化症 （％）		10 (0.4)	229 (9.0)	1,184 (46.5)	602 (23.6)	330 (13.0)	183 (7.2)	8 (0.3)	1 (0.0)	2,547 (100.0)	339	2,886	77.68	14.73
悪性高血圧 （％）		1 (0.4)	12 (4.3)	98 (34.9)	73 (26.0)	54 (19.2)	40 (14.2)	2 (0.7)	1 (0.4)	281 (100.0)	31	312	83.58	16.03
糖尿病性腎症 （％）	2 (0.0)	28 (0.2)	862 (7.4)	5,175 (44.5)	2,857 (24.6)	1,713 (14.7)	921 (7.9)	57 (0.5)	5 (0.0)	11,620 (100.0)	1,553	13,173	79.15	14.66
SLE腎炎 （％）		2 (0.6)	19 (5.9)	123 (38.3)	89 (27.7)	52 (16.2)	33 (10.3)	3 (0.9)		321 (100.0)	42	363	80.89	15.31
アミロイド腎 （％）			7 (12.5)	24 (42.9)	13 (23.2)	8 (14.3)	4 (7.1)			56 (100.0)	3	59	76.66	15.49
痛風腎 （％）			8 (6.1)	62 (47.0)	29 (22.0)	24 (18.2)	9 (6.8)			132 (100.0)	22	154	78.41	14.27
先天性代謝異常による腎不全 （％）			4 (10.8)	11 (29.7)	9 (24.3)	6 (16.2)	6 (16.2)	1 (2.7)		37 (100.0)	7	44	83.73	18.46
腎・尿路結核 （％）		1 (4.8)	3 (14.3)	11 (52.4)	5 (23.8)	1 (4.8)				21 (100.0)	1	22	69.38	14.60
腎・尿路結石 （％）		1 (1.6)	10 (16.4)	25 (41.0)	11 (18.0)	12 (19.7)	2 (3.3)			61 (100.0)	8	69	76.72	14.84
腎・尿路腫瘍 （％）			8 (10.4)	32 (41.6)	23 (29.9)	10 (13.0)	3 (3.9)	1 (1.3)		77 (100.0)	8	85	78.25	14.70
閉塞性尿路障害 （％）			11 (17.5)	22 (34.9)	18 (28.6)	8 (12.7)	3 (4.8)	1 (1.6)		63 (100.0)	11	74	77.87	16.31
骨髄腫 （％）			3 (16.7)	8 (44.4)	6 (33.3)	1 (5.6)				18 (100.0)	1	19	72.39	13.02
腎形成不全 （％）		1 (1.1)	8 (9.2)	33 (37.9)	24 (27.6)	9 (10.3)	11 (12.6)	1 (1.1)		87 (100.0)	14	101	80.37	16.17
不明 （％）	1 (0.0)	15 (0.5)	277 (9.2)	1,221 (40.6)	777 (25.8)	454 (15.1)	252 (8.4)	13 (0.4)	1 (0.0)	3,011 (100.0)	469	3,480	78.93	15.21
再導入 （％）			27 (7.2)	141 (37.4)	100 (26.5)	66 (17.5)	40 (10.6)	3 (0.8)		377 (100.0)	39	416	81.18	15.13
その他 （％）		4 (0.5)	77 (9.7)	325 (40.8)	178 (22.4)	122 (15.3)	83 (10.4)	5 (0.6)	2 (0.3)	796 (100.0)	93	889	79.54	16.36
合計 （％）	7 (0.0)	121 (0.3)	2,680 (7.7)	14,972 (42.8)	9,003 (25.7)	5,317 (15.2)	2,701 (7.7)	169 (0.5)	12 (0.0)	34,982 (100.0)	4,964	39,946	79.17	14.70
記載なし （％）														
総計 （％）	7 (0.0)	121 (0.3)	2,680 (7.7)	14,972 (42.8)	9,003 (25.7)	5,317 (15.2)	2,701 (7.7)	169 (0.5)	12 (0.0)	34,982 (100.0)	4,964	39,946	79.17	14.70

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査