

表 3848 透析前拡張期血圧(mmHg) 透析前脈拍(拍/分)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)		2 (11.8)	9 (52.9)	6 (35.3)						17 (100.0)		17	54.47	10.98
40～ (%)		1 (0.3)	78 (26.4)	169 (57.3)	41 (13.9)	3 (1.0)	2 (0.7)		1 (0.3)	295 (100.0)		295	66.78	12.75
50～ (%)		15 (0.6)	391 (14.9)	1,514 (57.6)	480 (18.3)	184 (7.0)	44 (1.7)	1 (0.0)	1 (0.0)	2,630 (100.0)	2	2,632	71.84	12.85
60～ (%)	1 (0.0)	22 (0.3)	777 (9.2)	4,333 (51.1)	2,069 (24.4)	962 (11.4)	298 (3.5)	10 (0.1)	2 (0.0)	8,474 (100.0)	16	8,490	75.98	13.08
70～ (%)	1 (0.0)	38 (0.4)	684 (6.5)	4,514 (42.9)	2,887 (27.4)	1,617 (15.4)	764 (7.3)	28 (0.3)	1 (0.0)	10,534 (100.0)	11	10,545	79.42	13.97
80～ (%)	3 (0.0)	22 (0.3)	364 (5.2)	2,465 (34.9)	2,005 (28.4)	1,352 (19.2)	793 (11.2)	52 (0.7)	4 (0.1)	7,060 (100.0)	3	7,063	82.61	14.91
90～ (%)	1 (0.0)	10 (0.3)	159 (4.8)	982 (29.8)	881 (26.8)	732 (22.2)	482 (14.6)	43 (1.3)	2 (0.1)	3,292 (100.0)	1	3,293	84.72	15.45
100～ (%)		4 (0.4)	71 (6.8)	301 (28.9)	236 (22.6)	219 (21.0)	186 (17.9)	25 (2.4)		1,042 (100.0)		1,042	85.43	17.21
110～ (%)	1 (0.4)		23 (8.8)	75 (28.7)	63 (24.1)	49 (18.8)	42 (16.1)	8 (3.1)		261 (100.0)		261	84.00	18.13
120～ (%)			8 (7.5)	32 (30.2)	21 (19.8)	27 (25.5)	17 (16.0)	1 (0.9)		106 (100.0)		106	83.95	18.14
合計 (%)	7 (0.0)	114 (0.3)	2,564 (7.6)	14,391 (42.7)	8,683 (25.8)	5,145 (15.3)	2,628 (7.8)	168 (0.5)	11 (0.0)	33,711 (100.0)	33	33,744	79.26	14.71
記載なし (%)		7 (0.6)	116 (9.1)	581 (45.7)	320 (25.2)	172 (13.5)	73 (5.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,271 (100.0)	4,931	6,202	76.75	14.39
総計 (%)	7 (0.0)	121 (0.3)	2,680 (7.7)	14,972 (42.8)	9,003 (25.7)	5,317 (15.2)	2,701 (7.7)	169 (0.5)	12 (0.0)	34,982 (100.0)	4,964	39,946	79.17	14.70
平均	83.71	73.60	71.13	72.89	76.27	79.20	82.67	87.93	75.64	75.43	70.03	75.43		
標準偏差	15.66	13.39	14.07	12.37	12.10	12.60	12.48	12.55	16.12	12.94	8.70	12.93		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査