

表 3859 透析前脈拍(拍/分) 治療方法別 (透析患者全体)

治療方法	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	160 (0.1)	2,037 (1.1)	16,498 (8.6)	50,806 (26.5)	60,627 (31.6)	38,189 (19.9)	16,569 (8.6)	5,073 (2.6)	1,198 (0.6)	514 (0.3)	191,671 (100.0)	63,970	255,641	74.47	12.79
血液透析濾過 (%)	19 (0.1)	306 (0.9)	2,705 (7.8)	8,712 (25.1)	10,825 (31.2)	7,276 (21.0)	3,382 (9.8)	1,078 (3.1)	268 (0.8)	111 (0.3)	34,682 (100.0)	8,601	43,283	75.44	12.95
血液濾過 (%)		1 (1.1)	6 (6.8)	24 (27.3)	30 (34.1)	13 (14.8)	10 (11.4)	2 (2.3)	1 (1.1)	1 (1.1)	88 (100.0)	4	92	75.07	14.00
血液吸着透析 (%)	1 (0.1)	11 (0.9)	103 (8.3)	324 (26.0)	407 (32.7)	245 (19.7)	114 (9.2)	25 (2.0)	7 (0.6)	8 (0.6)	1,245 (100.0)	385	1,630	74.87	12.90
在宅血液透析 (%)		1 (0.3)	13 (4.2)	65 (21.2)	112 (36.6)	67 (21.9)	34 (11.1)	11 (3.6)	2 (0.7)	1 (0.3)	306 (100.0)	215	521	77.12	12.08
腹膜透析 (%)	5 (0.1)	25 (0.6)	187 (4.5)	850 (20.6)	1,271 (30.9)	1,024 (24.9)	481 (11.7)	204 (5.0)	52 (1.3)	20 (0.5)	4,119 (100.0)	4,822	8,941	78.09	13.27
合計 (%)	185 (0.1)	2,381 (1.0)	19,512 (8.4)	60,781 (26.2)	73,272 (31.6)	46,814 (20.2)	20,590 (8.9)	6,393 (2.8)	1,528 (0.7)	655 (0.3)	232,111 (100.0)	77,997	310,108	74.69	12.84
記載なし (%)															
総計 (%)	185 (0.1)	2,381 (1.0)	19,512 (8.4)	60,781 (26.2)	73,272 (31.6)	46,814 (20.2)	20,590 (8.9)	6,393 (2.8)	1,528 (0.7)	655 (0.3)	232,111 (100.0)	77,997	310,108	74.69	12.84

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査