

表 3868 透析前脈拍(拍/分) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	115	1,419	11,083	31,643	36,028	23,117	10,327	3,247	775	300	118,054	28,979	147,033	74.25	13.01
(%)	(0.1)	(1.2)	(9.4)	(26.8)	(30.5)	(19.6)	(8.7)	(2.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
女性	40	510	4,690	17,098	22,156	13,606	5,591	1,657	382	198	65,928	16,010	81,938	74.94	12.40
(%)	(0.1)	(0.8)	(7.1)	(25.9)	(33.6)	(20.6)	(8.5)	(2.5)	(0.6)	(0.3)	(100.0)				
合計	155	1,929	15,773	48,741	58,184	36,723	15,918	4,904	1,157	498	183,982	44,989	228,971	74.50	12.80
(%)	(0.1)	(1.0)	(8.6)	(26.5)	(31.6)	(20.0)	(8.7)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	155	1,929	15,773	48,741	58,184	36,723	15,918	4,904	1,157	498	183,982	44,989	228,971	74.50	12.80
(%)	(0.1)	(1.0)	(8.6)	(26.5)	(31.6)	(20.0)	(8.7)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査