

表 3871 透析前脈拍(拍/分) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	34 (0.1)	572 (1.0)	4,955 (9.0)	15,390 (28.1)	17,654 (32.2)	10,286 (18.8)	4,114 (7.5)	1,286 (2.3)	331 (0.6)	159 (0.3)	54,781 (100.0)	13,796	68,577	73.79	12.62
慢性腎盂腎炎 (%)		15 (0.9)	136 (8.0)	460 (26.9)	545 (31.9)	308 (18.0)	176 (10.3)	50 (2.9)	18 (1.1)	2 (0.1)	1,710 (100.0)	455	2,165	75.07	12.99
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	3 (0.2)	15 (1.0)	113 (7.4)	361 (23.8)	526 (34.6)	307 (20.2)	136 (9.0)	38 (2.5)	18 (1.2)	2 (0.1)	1,519 (100.0)	315	1,834	75.18	12.69
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	2 (0.2)	4 (0.5)	52 (6.1)	241 (28.2)	290 (33.9)	168 (19.6)	70 (8.2)	21 (2.5)	7 (0.8)	1 (0.1)	856 (100.0)	208	1,064	74.59	12.07
その他の分類不 能の腎炎 (%)		5 (0.6)	46 (5.9)	189 (24.1)	282 (35.9)	164 (20.9)	73 (9.3)	18 (2.3)	4 (0.5)	4 (0.5)	785 (100.0)	164	949	75.46	12.11
多発性嚢胞腎 (%)	6 (0.1)	53 (0.8)	651 (9.7)	1,937 (29.0)	2,144 (32.1)	1,184 (17.7)	490 (7.3)	155 (2.3)	35 (0.5)	23 (0.3)	6,678 (100.0)	1,520	8,198	73.47	12.63
腎硬化症 (%)	10 (0.1)	268 (1.5)	2,014 (11.4)	5,399 (30.6)	5,356 (30.4)	2,866 (16.3)	1,215 (6.9)	349 (2.0)	102 (0.6)	56 (0.3)	17,635 (100.0)	3,825	21,460	72.47	12.76
悪性高血圧 (%)	2 (0.1)	9 (0.6)	126 (8.8)	385 (26.7)	475 (33.0)	268 (18.6)	126 (8.8)	40 (2.8)	6 (0.4)	3 (0.2)	1,440 (100.0)	441	1,881	74.25	12.37
糖尿病性腎症 (%)	80 (0.1)	697 (1.0)	5,424 (7.4)	17,431 (23.9)	22,834 (31.3)	16,217 (22.2)	7,377 (10.1)	2,284 (3.1)	458 (0.6)	163 (0.2)	72,965 (100.0)	17,542	90,507	75.64	12.83
SLE腎炎 (%)	1 (0.1)	4 (0.3)	76 (6.1)	271 (21.7)	409 (32.8)	301 (24.1)	124 (9.9)	42 (3.4)	12 (1.0)	7 (0.6)	1,247 (100.0)	303	1,550	76.94	12.86
アミロイド腎 (%)		5 (1.8)	16 (5.8)	69 (25.1)	92 (33.5)	61 (22.2)	26 (9.5)	6 (2.2)			275 (100.0)	50	325	74.89	11.98
痛風腎 (%)		15 (2.3)	54 (8.1)	180 (27.0)	241 (36.2)	114 (17.1)	44 (6.6)	15 (2.3)	1 (0.2)	2 (0.3)	666 (100.0)	162	828	73.21	12.09
先天性代謝異常 による腎不全 (%)			8 (5.7)	35 (25.0)	41 (29.3)	35 (25.0)	17 (12.1)	4 (2.9)			140 (100.0)	37	177	76.64	11.75
腎・尿路結核 (%)		1 (0.9)	12 (10.3)	28 (24.1)	39 (33.6)	19 (16.4)	13 (11.2)	3 (2.6)	1 (0.9)		116 (100.0)	42	158	74.72	12.72
腎・尿路結石 (%)	1 (0.3)	1 (0.3)	27 (7.8)	116 (33.4)	103 (29.7)	52 (15.0)	37 (10.7)	7 (2.0)		3 (0.9)	347 (100.0)	83	430	73.94	13.35
腎・尿路腫瘍 (%)		6 (1.0)	75 (12.7)	144 (24.4)	192 (32.5)	116 (19.6)	44 (7.4)	11 (1.9)	1 (0.2)	2 (0.3)	591 (100.0)	95	686	73.24	12.18
閉塞性尿路障害 (%)		3 (0.7)	30 (7.2)	112 (27.1)	115 (27.8)	85 (20.5)	51 (12.3)	13 (3.1)	5 (1.2)		414 (100.0)	103	517	75.85	13.04
骨髄腫 (%)		3 (1.9)	14 (9.1)	31 (20.1)	50 (32.5)	32 (20.8)	18 (11.7)	5 (3.2)	1 (0.6)		154 (100.0)	36	190	75.64	13.52
腎形成不全 (%)	1 (0.3)		16 (4.7)	63 (18.4)	117 (34.2)	83 (24.3)	37 (10.8)	17 (5.0)	7 (2.0)	1 (0.3)	342 (100.0)	77	419	78.39	13.41
不明 (%)	11 (0.1)	191 (1.2)	1,487 (9.4)	4,486 (28.4)	4,931 (31.2)	2,926 (18.5)	1,213 (7.7)	380 (2.4)	104 (0.7)	55 (0.3)	15,784 (100.0)	4,341	20,125	73.77	12.85
再導入 (%)		6 (0.5)	72 (6.1)	287 (24.3)	391 (33.1)	239 (20.2)	127 (10.7)	44 (3.7)	14 (1.2)	2 (0.2)	1,182 (100.0)	235	1,417	76.31	12.82
その他 (%)	4 (0.1)	56 (1.3)	369 (8.5)	1,126 (25.9)	1,357 (31.2)	892 (20.5)	390 (9.0)	116 (2.7)	32 (0.7)	13 (0.3)	4,355 (100.0)	1,159	5,514	74.83	13.19
合計 (%)	155 (0.1)	1,929 (1.0)	15,773 (8.6)	48,741 (26.5)	58,184 (31.6)	36,723 (20.0)	15,918 (8.7)	4,904 (2.7)	1,157 (0.6)	498 (0.3)	183,982 (100.0)	44,989	228,971	74.50	12.80
記載なし (%)															
総計 (%)	155 (0.1)	1,929 (1.0)	15,773 (8.6)	48,741 (26.5)	58,184 (31.6)	36,723 (20.0)	15,918 (8.7)	4,904 (2.7)	1,157 (0.6)	498 (0.3)	183,982 (100.0)	44,989	228,971	74.50	12.80

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査