

表 3874 透析前脈拍(拍/分) 性別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	8	207	1,776	5,431	6,443	4,359	2,136	673	161	67	21,261	3,933	25,194	75.29	13.08
(%)	(0.0)	(1.0)	(8.4)	(25.5)	(30.3)	(20.5)	(10.0)	(3.2)	(0.8)	(0.3)	(100.0)				
女性	9	88	856	3,059	4,102	2,704	1,157	369	100	39	12,483	2,269	14,752	75.66	12.67
(%)	(0.1)	(0.7)	(6.9)	(24.5)	(32.9)	(21.7)	(9.3)	(3.0)	(0.8)	(0.3)	(100.0)				
合計	17	295	2,632	8,490	10,545	7,063	3,293	1,042	261	106	33,744	6,202	39,946	75.43	12.93
(%)	(0.1)	(0.9)	(7.8)	(25.2)	(31.3)	(20.9)	(9.8)	(3.1)	(0.8)	(0.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	17	295	2,632	8,490	10,545	7,063	3,293	1,042	261	106	33,744	6,202	39,946	75.43	12.93
(%)	(0.1)	(0.9)	(7.8)	(25.2)	(31.3)	(20.9)	(9.8)	(3.1)	(0.8)	(0.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査