

表 3875 透析前脈拍(拍/分) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 年齢           | 40未満        | 40～          | 50～            | 60～             | 70～              | 80～             | 90～             | 100～           | 110～         | 120～         | 合計                | 記載なし  | 総計     | 平均    | 標準偏差  |
|--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| 15歳未満<br>(%) |             |              |                | 1<br>(100.0)    |                  |                 |                 |                |              |              | 1<br>(100.0)      | 1     | 2      | 69.00 |       |
| 15歳～<br>(%)  |             |              | 3<br>(2.2)     | 26<br>(19.4)    | 42<br>(31.3)     | 35<br>(26.1)    | 18<br>(13.4)    | 4<br>(3.0)     | 6<br>(4.5)   |              | 134<br>(100.0)    | 28    | 162    | 80.10 | 12.81 |
| 30歳～<br>(%)  |             | 5<br>(0.2)   | 56<br>(2.6)    | 272<br>(12.9)   | 629<br>(29.7)    | 595<br>(28.1)   | 366<br>(17.3)   | 151<br>(7.1)   | 35<br>(1.7)  | 6<br>(0.3)   | 2,115<br>(100.0)  | 373   | 2,488  | 81.69 | 12.73 |
| 45歳～<br>(%)  |             | 26<br>(0.3)  | 318<br>(4.1)   | 1,476<br>(19.2) | 2,429<br>(31.6)  | 1,952<br>(25.4) | 1,066<br>(13.9) | 326<br>(4.2)   | 71<br>(0.9)  | 28<br>(0.4)  | 7,692<br>(100.0)  | 1,481 | 9,173  | 78.62 | 12.59 |
| 60歳～<br>(%)  | 5<br>(0.0)  | 146<br>(0.9) | 1,347<br>(8.4) | 4,379<br>(27.2) | 5,188<br>(32.2)  | 3,168<br>(19.7) | 1,338<br>(8.3)  | 384<br>(2.4)   | 93<br>(0.6)  | 46<br>(0.3)  | 16,094<br>(100.0) | 2,920 | 19,014 | 74.39 | 12.48 |
| 75歳～<br>(%)  | 12<br>(0.2) | 114<br>(1.5) | 859<br>(11.6)  | 2,247<br>(30.3) | 2,180<br>(29.4)  | 1,269<br>(17.1) | 482<br>(6.5)    | 171<br>(2.3)   | 55<br>(0.7)  | 25<br>(0.3)  | 7,414<br>(100.0)  | 1,340 | 8,754  | 72.66 | 13.03 |
| 90歳～<br>(%)  |             | 4<br>(1.4)   | 49<br>(16.7)   | 89<br>(30.3)    | 77<br>(26.2)     | 44<br>(15.0)    | 23<br>(7.8)     | 6<br>(2.0)     | 1<br>(0.3)   | 1<br>(0.3)   | 294<br>(100.0)    | 56    | 350    | 71.44 | 13.31 |
| 合計<br>(%)    | 17<br>(0.1) | 295<br>(0.9) | 2,632<br>(7.8) | 8,490<br>(25.2) | 10,545<br>(31.3) | 7,063<br>(20.9) | 3,293<br>(9.8)  | 1,042<br>(3.1) | 261<br>(0.8) | 106<br>(0.3) | 33,744<br>(100.0) | 6,199 | 39,943 | 75.43 | 12.93 |
| 不明<br>(%)    |             |              |                |                 |                  |                 |                 |                |              |              |                   | 3     | 3      |       |       |
| 記載なし<br>(%)  |             |              |                |                 |                  |                 |                 |                |              |              |                   |       |        |       |       |
| 総計<br>(%)    | 17<br>(0.1) | 295<br>(0.9) | 2,632<br>(7.8) | 8,490<br>(25.2) | 10,545<br>(31.3) | 7,063<br>(20.9) | 3,293<br>(9.8)  | 1,042<br>(3.1) | 261<br>(0.8) | 106<br>(0.3) | 33,744<br>(100.0) | 6,202 | 39,946 | 75.43 | 12.93 |
| 平均           | 77.24       | 71.43        | 69.95          | 67.45           | 64.82            | 62.86           | 61.03           | 60.05          | 60.92        | 65.00        | 64.99             | 64.90 | 64.98  |       |       |
| 標準偏差         | 6.48        | 10.06        | 10.66          | 11.35           | 12.06            | 12.65           | 13.02           | 13.72          | 14.95        | 12.29        | 12.37             | 12.43 | 12.38  |       |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査