

表 3877 透析前脈拍(拍/分) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	6 (0.0)	109 (0.9)	1,064 (8.5)	3,331 (26.5)	4,069 (32.4)	2,479 (19.7)	1,057 (8.4)	319 (2.5)	92 (0.7)	32 (0.3)	12,558 (100.0)	2,518	15,076	74.51	12.66
慢性腎盂腎炎 （％）		3 (0.9)	16 (4.6)	96 (27.7)	107 (30.8)	62 (17.9)	42 (12.1)	18 (5.2)	3 (0.9)		347 (100.0)	75	422	76.38	13.04
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		3 (1.2)	23 (9.2)	69 (27.6)	76 (30.4)	50 (20.0)	20 (8.0)	7 (2.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	250 (100.0)	34	284	74.13	12.85
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		2 (0.6)	19 (6.0)	79 (25.0)	105 (33.2)	70 (22.2)	20 (6.3)	15 (4.7)	4 (1.3)	2 (0.6)	316 (100.0)	43	359	76.32	13.14
その他の分類不 能の腎炎 （％）		2 (1.2)	17 (10.3)	48 (29.1)	47 (28.5)	27 (16.4)	16 (9.7)	6 (3.6)	2 (1.2)		165 (100.0)	30	195	74.12	13.45
多発性嚢胞腎 （％）	1 (0.1)	9 (0.7)	110 (8.9)	345 (28.0)	403 (32.8)	227 (18.5)	87 (7.1)	40 (3.3)	6 (0.5)	2 (0.2)	1,230 (100.0)	234	1,464	73.96	12.39
腎硬化症 （％）	2 (0.1)	24 (1.0)	278 (11.3)	701 (28.5)	753 (30.6)	437 (17.7)	180 (7.3)	63 (2.6)	18 (0.7)	7 (0.3)	2,463 (100.0)	423	2,886	73.41	12.89
悪性高血圧 （％）		3 (1.1)	17 (6.3)	63 (23.5)	91 (34.0)	58 (21.6)	28 (10.4)	7 (2.6)	1 (0.4)		268 (100.0)	44	312	75.57	11.87
糖尿病性腎症 （％）	6 (0.1)	98 (0.9)	706 (6.3)	2,508 (22.3)	3,414 (30.4)	2,597 (23.1)	1,367 (12.2)	415 (3.7)	92 (0.8)	41 (0.4)	11,244 (100.0)	1,929	13,173	76.96	13.07
SLE腎炎 （％）		1 (0.3)	19 (6.1)	81 (26.0)	98 (31.4)	63 (20.2)	29 (9.3)	14 (4.5)	6 (1.9)	1 (0.3)	312 (100.0)	51	363	76.55	13.44
アミロイド腎 （％）			3 (5.6)	19 (35.2)	10 (18.5)	12 (22.2)	7 (13.0)	2 (3.7)	1 (1.9)		54 (100.0)	5	59	76.56	13.68
痛風腎 （％）	1 (0.8)	2 (1.5)	12 (9.2)	33 (25.2)	35 (26.7)	27 (20.6)	18 (13.7)	2 (1.5)	1 (0.8)		131 (100.0)	23	154	74.85	13.44
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			5 (14.3)	10 (28.6)	10 (28.6)	6 (17.1)	3 (8.6)	1 (2.9)			35 (100.0)	9	44	72.89	11.89
腎・尿路結核 （％）		1 (5.3)	3 (15.8)	3 (15.8)	4 (21.1)	5 (26.3)	3 (15.8)				19 (100.0)	3	22	73.16	15.04
腎・尿路結石 （％）	1 (1.7)		4 (6.8)	17 (28.8)	14 (23.7)	14 (23.7)	8 (13.6)	1 (1.7)			59 (100.0)	10	69	74.85	13.30
腎・尿路腫瘍 （％）		1 (1.3)	7 (9.2)	25 (32.9)	17 (22.4)	14 (18.4)	8 (10.5)	4 (5.3)			76 (100.0)	9	85	73.54	13.61
閉塞性尿路障害 （％）		1 (1.6)	7 (11.1)	15 (23.8)	20 (31.7)	14 (22.2)	5 (7.9)	1 (1.6)			63 (100.0)	11	74	73.76	12.34
骨髄腫 （％）			3 (17.6)	5 (29.4)	5 (29.4)	2 (11.8)	2 (11.8)				17 (100.0)	2	19	72.59	12.03
腎形成不全 （％）		1 (1.2)	1 (1.2)	20 (23.8)	23 (27.4)	23 (27.4)	9 (10.7)	5 (6.0)	1 (1.2)	1 (1.2)	84 (100.0)	17	101	79.33	13.75
不明 （％）		20 (0.7)	233 (8.0)	757 (25.9)	909 (31.1)	620 (21.2)	262 (9.0)	89 (3.0)	23 (0.8)	12 (0.4)	2,925 (100.0)	555	3,480	75.41	12.84
再導入 （％）		3 (0.8)	23 (6.5)	85 (24.0)	108 (30.5)	79 (22.3)	40 (11.3)	11 (3.1)	5 (1.4)		354 (100.0)	62	416	76.45	12.95
その他 （％）		12 (1.6)	62 (8.0)	180 (23.3)	227 (29.3)	177 (22.9)	82 (10.6)	22 (2.8)	5 (0.6)	7 (0.9)	774 (100.0)	115	889	76.02	13.75
合計 （％）	17 (0.1)	295 (0.9)	2,632 (7.8)	8,490 (25.2)	10,545 (31.3)	7,063 (20.9)	3,293 (9.8)	1,042 (3.1)	261 (0.8)	106 (0.3)	33,744 (100.0)	6,202	39,946	75.43	12.93
記載なし （％）															
総計 （％）	17 (0.1)	295 (0.9)	2,632 (7.8)	8,490 (25.2)	10,545 (31.3)	7,063 (20.9)	3,293 (9.8)	1,042 (3.1)	261 (0.8)	106 (0.3)	33,744 (100.0)	6,202	39,946	75.43	12.93

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査