

表 3879 透析前脈拍(拍/分) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析後体重	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (11.1)	4 (44.4)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)				9 (100.0)	3	12	69.33	11.54
20～ (%)		1 (1.5)	3 (4.5)	19 (28.4)	20 (29.9)	11 (16.4)	7 (10.4)	5 (7.5)	1 (1.5)		67 (100.0)	9	76	76.27	14.33
30～ (%)	1 (0.0)	25 (1.1)	225 (9.8)	612 (26.5)	753 (32.6)	416 (18.0)	170 (7.4)	74 (3.2)	21 (0.9)	10 (0.4)	2,307 (100.0)	375	2,682	74.26	13.27
40～ (%)	5 (0.1)	88 (1.0)	755 (8.7)	2,419 (28.0)	2,752 (31.8)	1,696 (19.6)	655 (7.6)	194 (2.2)	54 (0.6)	25 (0.3)	8,643 (100.0)	1,362	10,005	73.96	12.49
50～ (%)	8 (0.1)	96 (0.9)	942 (8.7)	2,888 (26.7)	3,375 (31.2)	2,150 (19.9)	974 (9.0)	274 (2.5)	79 (0.7)	26 (0.2)	10,812 (100.0)	1,678	12,490	74.61	12.72
60～ (%)	2 (0.0)	64 (0.9)	518 (7.2)	1,771 (24.6)	2,282 (31.7)	1,525 (21.2)	746 (10.4)	217 (3.0)	56 (0.8)	22 (0.3)	7,203 (100.0)	1,162	8,365	75.78	12.81
70～ (%)	1 (0.0)	13 (0.4)	139 (4.7)	551 (18.8)	877 (29.9)	768 (26.2)	413 (14.1)	135 (4.6)	22 (0.7)	16 (0.5)	2,935 (100.0)	488	3,423	78.78	13.02
80～ (%)		8 (0.7)	38 (3.4)	164 (14.8)	315 (28.4)	288 (26.0)	197 (17.8)	82 (7.4)	11 (1.0)	5 (0.5)	1,108 (100.0)	165	1,273	80.97	13.32
90～ (%)			5 (1.2)	40 (10.0)	96 (23.9)	134 (33.4)	84 (20.9)	31 (7.7)	9 (2.2)	2 (0.5)	401 (100.0)	54	455	84.14	12.03
100～ (%)			1 (0.8)	9 (7.3)	37 (29.8)	39 (31.5)	22 (17.7)	12 (9.7)	4 (3.2)		124 (100.0)	18	142	84.26	11.81
110～ (%)			1 (1.8)	2 (3.6)	12 (21.8)	20 (36.4)	13 (23.6)	7 (12.7)			55 (100.0)	6	61	85.98	11.42
120～ (%)				2 (5.9)	2 (5.9)	9 (26.5)	8 (23.5)	10 (29.4)	3 (8.8)		34 (100.0)	3	37	93.03	12.81
合計 (%)	17 (0.1)	295 (0.9)	2,628 (7.8)	8,481 (25.2)	10,523 (31.2)	7,057 (20.9)	3,290 (9.8)	1,041 (3.1)	260 (0.8)	106 (0.3)	33,698 (100.0)	5,323	39,021	75.43	12.93
記載なし (%)			4 (8.7)	9 (19.6)	22 (47.8)	6 (13.0)	3 (6.5)	1 (2.2)	1 (2.2)		46 (100.0)	879	925	73.98	12.74
総計 (%)	17 (0.1)	295 (0.9)	2,632 (7.8)	8,490 (25.2)	10,545 (31.3)	7,063 (20.9)	3,293 (9.8)	1,042 (3.1)	261 (0.8)	106 (0.3)	33,744 (100.0)	6,202	39,946	75.43	12.93
平均	52.84	53.80	53.87	54.80	56.19	58.15	60.18	61.49	59.21	57.97	56.63	56.60	56.63		
標準偏差	10.39	10.97	10.73	11.41	12.57	13.98	14.88	17.30	16.87	14.04	13.07	12.77	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査