

表 3883 脈拍(拍/分) 原疾患別 (腹膜透析患者)

原疾患	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.1)	7 (0.5)	70 (4.8)	317 (21.6)	455 (31.0)	371 (25.2)	163 (11.1)	68 (4.6)	14 (1.0)	4 (0.3)	1,470 (100.0)	1,589	3,059	77.69	12.88
慢性腎盂腎炎 (%)			2 (4.4)	9 (20.0)	7 (15.6)	15 (33.3)	6 (13.3)	4 (8.9)	2 (4.4)		45 (100.0)	48	93	81.98	14.18
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			3 (8.6)	1 (2.9)	13 (37.1)	10 (28.6)	7 (20.0)	1 (2.9)			35 (100.0)	39	74	81.37	11.63
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			1 (8.3)	1 (8.3)	5 (41.7)	5 (41.7)					12 (100.0)	20	32	76.33	8.98
その他の分類不 能の腎炎 (%)			1 (2.6)	4 (10.5)	14 (36.8)	8 (21.1)	5 (13.2)	3 (7.9)	2 (5.3)	1 (2.6)	38 (100.0)	47	85	82.63	15.00
多発性嚢胞腎 (%)			5 (4.5)	17 (15.2)	30 (26.8)	36 (32.1)	13 (11.6)	6 (5.4)	4 (3.6)	1 (0.9)	112 (100.0)	131	243	80.50	13.71
腎硬化症 (%)		4 (0.8)	29 (5.9)	113 (23.0)	158 (32.2)	115 (23.4)	46 (9.4)	22 (4.5)	3 (0.6)	1 (0.2)	491 (100.0)	592	1,083	76.19	12.72
悪性高血圧 (%)				11 (25.0)	11 (25.0)	11 (25.0)	5 (11.4)	5 (11.4)	1 (2.3)		44 (100.0)	63	107	81.09	13.31
糖尿病性腎症 (%)	2 (0.2)	10 (0.8)	41 (3.3)	258 (20.6)	387 (31.0)	322 (25.8)	157 (12.6)	59 (4.7)	11 (0.9)	3 (0.2)	1,250 (100.0)	1,516	2,766	78.19	12.78
SLE腎炎 (%)			1 (3.0)	5 (15.2)	15 (45.5)	5 (15.2)	3 (9.1)	2 (6.1)	1 (3.0)	1 (3.0)	33 (100.0)	29	62	79.61	15.19
アミロイド腎 (%)						1 (100.0)					1 (100.0)	8	9	87.00	
痛風腎 (%)			1 (5.0)	4 (20.0)	9 (45.0)	5 (25.0)		1 (5.0)			20 (100.0)	13	33	74.80	10.92
先天性代謝異常 による腎不全 (%)		1 (10.0)	1 (10.0)		2 (20.0)	4 (40.0)	2 (20.0)				10 (100.0)	8	18	75.80	15.74
腎・尿路結核 (%)							1 (100.0)				1 (100.0)		1	90.00	
腎・尿路結石 (%)				1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)				5 (100.0)	11	16	80.60	10.45
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (12.5)	1 (12.5)	3 (37.5)	2 (25.0)	1 (12.5)				8 (100.0)	6	14	74.38	13.69
閉塞性尿路障害 (%)				2 (18.2)	5 (45.5)	1 (9.1)	2 (18.2)			1 (9.1)	11 (100.0)	11	22	81.27	16.54
骨髄腫 (%)					1 (50.0)		1 (50.0)				2 (100.0)	6	8	84.50	20.51
腎形成不全 (%)				1 (3.8)	8 (30.8)	6 (23.1)	4 (15.4)	5 (19.2)		2 (7.7)	26 (100.0)	50	76	89.88	17.14
不明 (%)	2 (0.5)	3 (0.8)	27 (7.3)	76 (20.4)	115 (30.9)	80 (21.5)	44 (11.8)	14 (3.8)	8 (2.2)	3 (0.8)	372 (100.0)	468	840	77.28	14.39
再導入 (%)				6 (25.0)	8 (33.3)	4 (16.7)	4 (16.7)	1 (4.2)	1 (4.2)		24 (100.0)	27	51	80.17	13.34
その他 (%)			4 (3.7)	23 (21.1)	24 (22.0)	21 (19.3)	16 (14.7)	13 (11.9)	5 (4.6)	3 (2.8)	109 (100.0)	140	249	82.43	16.62
合計 (%)	5 (0.1)	25 (0.6)	187 (4.5)	850 (20.6)	1,271 (30.9)	1,024 (24.9)	481 (11.7)	204 (5.0)	52 (1.3)	20 (0.5)	4,119 (100.0)	4,822	8,941	78.09	13.27
記載なし (%)															
総計 (%)	5 (0.1)	25 (0.6)	187 (4.5)	850 (20.6)	1,271 (30.9)	1,024 (24.9)	481 (11.7)	204 (5.0)	52 (1.3)	20 (0.5)	4,119 (100.0)	4,822	8,941	78.09	13.27

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査