

表 3889 現在施行中のPD歴(年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	1年未満	1年～	2年～	4年～	6年～	8年～	10年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)												
PD単独 (%)	1,252 (96.8)	948 (90.3)	1,269 (83.9)	640 (73.7)	269 (59.6)	101 (47.4)	109 (42.9)	4,588 (81.3)	2,600 (78.9)	7,188 (80.4)	2.80	2.72
HD(F)単独,PDカテ あり (%)												
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	35 (2.7)	93 (8.9)	219 (14.5)	205 (23.6)	151 (33.5)	86 (40.4)	113 (44.5)	902 (16.0)	642 (19.5)	1,544 (17.3)	5.69	3.92
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	3 (0.2)	6 (0.6)	12 (0.8)	16 (1.8)	25 (5.5)	22 (10.3)	21 (8.3)	105 (1.9)	36 (1.1)	141 (1.6)	7.37	4.03
PD,HD併用週3 HD(F) (%)												
PD,HD併用週4 HD(F) (%)												
PD,HD併用その他 (%)	3 (0.2)	3 (0.3)	13 (0.9)	7 (0.8)	6 (1.3)	4 (1.9)	11 (4.3)	47 (0.8)	16 (0.5)	63 (0.7)	6.81	5.04
合計 (%)	1,293 (100.0)	1,050 (100.0)	1,513 (100.0)	868 (100.0)	451 (100.0)	213 (100.0)	254 (100.0)	5,642 (100.0)	3,294 (100.0)	8,936 (100.0)	3.38	3.24
不明		1	1				1	3	2	5	5.92	6.73
記載なし												
総計	1,293	1,051	1,514	868	451	213	255	5,645	3,296	8,941	3.38	3.24

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査