

表 3906 PET施行の有無 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

| 治療方法 (新分類) | なし | PET施行 | Fast PETのみ | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|-------|-------|
| 腹膜透析 (CAPD) (%) | 986 (34.0) | 1,251 (43.1) | 666 (22.9) | 2,903 (100.0) | 64 | 2,054 | 5,021 |
| 腹膜透析 (APD) (%) | 621 (35.1) | 714 (40.3) | 436 (24.6) | 1,771 (100.0) | 33 | 1,035 | 2,839 |
| 腹膜透析 (CCPD) (%) | 205 (29.0) | 326 (46.1) | 176 (24.9) | 707 (100.0) | 31 | 343 | 1,081 |
| 合計 (%) | 1,812 (33.7) | 2,291 (42.6) | 1,278 (23.8) | 5,381 (100.0) | 128 | 3,432 | 8,941 |
| 記載なし (%) | | | | | | | |
| 総計 (%) | 1,812 (33.7) | 2,291 (42.6) | 1,278 (23.8) | 5,381 (100.0) | 128 | 3,432 | 8,941 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査