

表 3927 使用透析液の種類 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)													
PD単独 (%)	2,091 (46.4)	565 (12.5)	126 (2.8)	7 (0.2)	51 (1.1)	1,005 (22.3)	366 (8.1)	294 (6.5)	3 (0.1)	4,508 (100.0)	48	2,632	7,188
HD(F)単独,PDカテあり (%)													
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	156 (17.9)	189 (21.7)	37 (4.2)	1 (0.1)	5 (0.6)	194 (22.2)	164 (18.8)	124 (14.2)	2 (0.2)	872 (100.0)	17	655	1,544
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	19 (18.8)	22 (21.8)	10 (9.9)		1 (1.0)	16 (15.8)	17 (16.8)	15 (14.9)	1 (1.0)	101 (100.0)		40	141
PD,HD併用週3 HD(F) (%)													
PD,HD併用週4 HD(F) (%)													
PD,HD併用その他 (%)	9 (18.8)	10 (20.8)	4 (8.3)		7 (14.6)	12 (25.0)	6 (12.5)			48 (100.0)		15	63
合計 (%)	2,275 (41.1)	786 (14.2)	177 (3.2)	8 (0.1)	57 (1.0)	1,222 (22.1)	559 (10.1)	439 (7.9)	6 (0.1)	5,529 (100.0)	65	3,342	8,936
不明 (%)		1 (33.3)						2 (66.7)		3 (100.0)		2	5
記載なし (%)													
総計 (%)	2,275 (41.1)	787 (14.2)	177 (3.2)	8 (0.1)	57 (1.0)	1,222 (22.1)	559 (10.1)	441 (8.0)	6 (0.1)	5,532 (100.0)	65	3,344	8,941

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査