

表 3929 使用透析液の種類 年齢(歳)別（腹膜透析患者）

年齢	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満（%）	16 (30.8)	13 (25.0)	8 (15.4)	4 (7.7)		1 (1.9)	2 (3.8)	7 (13.5)	1 (1.9)	52 (100.0)		45	97
15歳～（%）	36 (48.6)	15 (20.3)	5 (6.8)			8 (10.8)	6 (8.1)	3 (4.1)	1 (1.4)	74 (100.0)	1	36	111
30歳～（%）	179 (41.5)	54 (12.5)	14 (3.2)		4 (0.9)	92 (21.3)	43 (10.0)	45 (10.4)		431 (100.0)	2	268	701
45歳～（%）	538 (38.1)	182 (12.9)	48 (3.4)		7 (0.5)	306 (21.7)	188 (13.3)	144 (10.2)		1,413 (100.0)	16	873	2,302
60歳～（%）	1,089 (43.2)	380 (15.1)	64 (2.5)	3 (0.1)	19 (0.8)	549 (21.8)	253 (10.0)	158 (6.3)	3 (0.1)	2,518 (100.0)	32	1,484	4,034
75歳～（%）	393 (40.2)	136 (13.9)	31 (3.2)	1 (0.1)	24 (2.5)	252 (25.8)	62 (6.3)	78 (8.0)	1 (0.1)	978 (100.0)	13	600	1,591
90歳～（%）	24 (36.4)	7 (10.6)	7 (10.6)		3 (4.5)	14 (21.2)	5 (7.6)	6 (9.1)		66 (100.0)	1	38	105
合計（%）	2,275 (41.1)	787 (14.2)	177 (3.2)	8 (0.1)	57 (1.0)	1,222 (22.1)	559 (10.1)	441 (8.0)	6 (0.1)	5,532 (100.0)	65	3,344	8,941
不明（%）													
記載なし（%）													
総計（%）	2,275 (41.1)	787 (14.2)	177 (3.2)	8 (0.1)	57 (1.0)	1,222 (22.1)	559 (10.1)	441 (8.0)	6 (0.1)	5,532 (100.0)	65	3,344	8,941
平均	62.75	62.39	59.90	37.75	70.72	63.71	60.80	60.54	51.67	62.48	65.05	62.34	62.45
標準偏差	14.07	15.06	19.72	38.32	14.28	13.14	12.51	15.39	30.11	14.36	11.84	14.86	14.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査