

表 3930 使用透析液の種類 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析患者）

現在施行中のPD歴	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	742	89	31	4	32	239	37	61		1,235	8	50	1,293
(%)	(60.1)	(7.2)	(2.5)	(0.3)	(2.6)	(19.4)	(3.0)	(4.9)		(100.0)			
1年～	470	125	37	1	12	229	72	62		1,008	13	30	1,051
(%)	(46.6)	(12.4)	(3.7)	(0.1)	(1.2)	(22.7)	(7.1)	(6.2)		(100.0)			
2年～	548	204	49		7	369	144	120	2	1,443	33	38	1,514
(%)	(38.0)	(14.1)	(3.4)		(0.5)	(25.6)	(10.0)	(8.3)	(0.1)	(100.0)			
4年～	265	135	23	1	2	209	115	90	2	842	7	19	868
(%)	(31.5)	(16.0)	(2.7)	(0.1)	(0.2)	(24.8)	(13.7)	(10.7)	(0.2)	(100.0)			
6年～	111	86	11	1	2	79	93	55	1	439	2	10	451
(%)	(25.3)	(19.6)	(2.5)	(0.2)	(0.5)	(18.0)	(21.2)	(12.5)	(0.2)	(100.0)			
8年～	50	49	8			40	36	19	1	203	2	8	213
(%)	(24.6)	(24.1)	(3.9)			(19.7)	(17.7)	(9.4)	(0.5)	(100.0)			
10年～	58	73	14	1	1	29	50	26		252		3	255
(%)	(23.0)	(29.0)	(5.6)	(0.4)	(0.4)	(11.5)	(19.8)	(10.3)		(100.0)			
合計	2,244	761	173	8	56	1,194	547	433	6	5,422	65	158	5,645
(%)	(41.4)	(14.0)	(3.2)	(0.1)	(1.0)	(22.0)	(10.1)	(8.0)	(0.1)	(100.0)			
記載なし	31	26	4		1	28	12	8		110		3,186	3,296
(%)	(28.2)	(23.6)	(3.6)		(0.9)	(25.5)	(10.9)	(7.3)		(100.0)			
総計	2,275	787	177	8	57	1,222	559	441	6	5,532	65	3,344	8,941
(%)	(41.1)	(14.2)	(3.2)	(0.1)	(1.0)	(22.1)	(10.1)	(8.0)	(0.1)	(100.0)			
平均	2.59	4.62	3.90	3.33	1.51	3.13	5.04	4.17	5.56	3.40	2.90	2.76	3.38
標準偏差	2.80	3.97	4.06	4.51	2.00	2.61	3.70	3.28	2.48	3.27	1.95	2.73	3.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査