

表 3B31 使用透析液の種類 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	830 (%)	308 (15.5)	48 (2.4)	1 (0.1)	15 (0.8)	418 (21.1)	226 (11.4)	132 (6.7)	3 (0.2)	1,981 (100.0)	19	1,059	3,059
慢性腎盂腎炎	30 (%)	10 (15.9)	2 (3.2)		1 (1.6)	9 (14.3)	8 (12.7)	3 (4.8)		63 (100.0)		30	93
急速進行性糸球体腎炎	15 (%)	10 (32.6)	1 (2.2)			10 (21.7)	6 (13.0)	4 (8.7)		46 (100.0)		28	74
妊婦腎/妊娠中毒症	9 (%)	3 (37.5)	2 (8.3)		1 (4.2)	3 (12.5)	3 (12.5)	3 (12.5)		24 (100.0)		8	32
その他の分型不明の腎炎	21 (%)	9 (38.2)	2 (3.6)	1 (1.8)		14 (25.5)	3 (5.5)	5 (9.1)		55 (100.0)	2	28	85
多発性囊胞腎	83 (%)	19 (52.5)	3 (1.9)		1 (0.6)	34 (21.5)	8 (5.1)	9 (5.7)	1 (0.6)	158 (100.0)	2	83	243
腎硬化症	305 (%)	90 (44.3)	13 (13.1)	1 (0.1)	10 (1.5)	175 (25.4)	48 (7.0)	46 (6.7)		688 (100.0)	8	387	1,083
悪性高血圧	29 (%)	5 (45.3)	2 (3.1)	1 (1.6)		12 (18.8)	9 (14.1)	6 (9.4)		64 (100.0)	1	42	107
糖尿病性腎症	582 (%)	208 (35.9)	65 (12.8)	1 (0.1)	20 (1.2)	389 (24.0)	182 (11.2)	173 (10.7)	1 (0.1)	1,821 (100.0)	26	1,119	2,766
SLE腎炎	15 (%)	7 (39.5)	1 (2.6)			8 (21.1)	3 (7.9)	3 (7.9)	1 (2.6)	38 (100.0)	1	23	62
アミロイド腎	1 (%)					3 (60.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		4	9
痛風腎	11 (%)	3 (45.8)	1 (4.2)			7 (29.2)	1 (4.2)	1 (4.2)		24 (100.0)	1	8	33
先天性代謝異常による腎不全	6 (%)		1 (8.3)			3 (25.0)	2 (16.7)			12 (100.0)		6	18
腎・尿路結核	1 (%)									1 (100.0)			1
腎・尿路結石	5 (%)		1 (11.1)			2 (22.2)	1 (11.1)			9 (100.0)		7	16
腎・尿路腫瘍	5 (%)	1 (50.0)				3 (30.0)	1 (10.0)			10 (100.0)	1	3	14
閉塞性尿路障害	9 (%)	2 (75.0)				1 (8.3)				12 (100.0)	1	9	22
骨髄腫						3 (100.0)				3 (100.0)		5	8
腎形成不全	20 (%)	8 (40.8)	10 (20.4)	2 (4.1)		4 (8.2)	3 (6.1)	2 (4.1)		49 (100.0)		27	76
不明	222 (%)	66 (45.9)	16 (3.3)		5 (1.0)	95 (19.6)	39 (8.1)	41 (8.5)		484 (100.0)	3	353	840
再導入	11 (%)	11 (31.4)	1 (2.9)			2 (5.7)	5 (14.3)	5 (14.3)		35 (100.0)		16	51
その他	65 (%)	27 (41.5)	8 (12.3)	1 (1.5)	4 (6.2)	27 (42.4)	10 (15.4)	8 (12.3)		150 (100.0)		99	249
合計	2,275 (41.1)	787 (14.2)	177 (3.2)	8 (0.1)	57 (1.0)	1,222 (22.1)	599 (10.1)	441 (8.0)	8 (0.1)	5,532 (100.0)	65	3,344	8,941
記載なし													
総計	2,275 (41.1)	787 (14.2)	177 (3.2)	8 (0.1)	57 (1.0)	1,222 (22.1)	599 (10.1)	441 (8.0)	8 (0.1)	5,532 (100.0)	65	3,344	8,941

数値下のかっこ内は方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査