

表 3932 使用透析液の種類 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	222	38	9	2	4	107	42	17		441		272	713
（%）	(50.3)	(8.6)	(2.0)	(0.5)	(0.9)	(24.3)	(9.5)	(3.9)		(100.0)			
私立大学	285	74	22		10	138	48	64		641		492	1,133
（%）	(44.5)	(11.5)	(3.4)		(1.6)	(21.5)	(7.5)	(10.0)		(100.0)			
国立	64	10	3		1	46	11	5		140		62	202
（%）	(45.7)	(7.1)	(2.1)		(0.7)	(32.9)	(7.9)	(3.6)		(100.0)			
県市町村立	384	117	17	3	15	233	114	71	2	956	2	628	1,586
（%）	(40.2)	(12.2)	(1.8)	(0.3)	(1.6)	(24.4)	(11.9)	(7.4)	(0.2)	(100.0)			
社会保険	95	26	1		3	53	13	5		196	1	290	487
（%）	(48.5)	(13.3)	(0.5)		(1.5)	(27.0)	(6.6)	(2.6)		(100.0)			
厚生連	145	77	11		2	110	31	50		426	1	199	626
（%）	(34.0)	(18.1)	(2.6)		(0.5)	(25.8)	(7.3)	(11.7)		(100.0)			
その他公的	389	128	26		3	177	70	70	1	864	2	453	1,319
（%）	(45.0)	(14.8)	(3.0)		(0.3)	(20.5)	(8.1)	(8.1)	(0.1)	(100.0)			
私立総合	113	78	17		2	32	42	36		320		57	377
（%）	(35.3)	(24.4)	(5.3)		(0.6)	(10.0)	(13.1)	(11.3)		(100.0)			
私立	358	138	43	2	12	221	107	78	1	960	55	674	1,689
（%）	(37.3)	(14.4)	(4.5)	(0.2)	(1.3)	(23.0)	(11.1)	(8.1)	(0.1)	(100.0)			
私立診療所	220	101	28	1	5	105	81	45	2	588	4	217	809
（%）	(37.4)	(17.2)	(4.8)	(0.2)	(0.9)	(17.9)	(13.8)	(7.7)	(0.3)	(100.0)			
総計	2,275	787	177	8	57	1,222	559	441	6	5,532	65	3,344	8,941
（%）	(41.1)	(14.2)	(3.2)	(0.1)	(1.0)	(22.1)	(10.1)	(8.0)	(0.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査