

表 3934 使用透析液の種類 性別（腹膜透析単独患者）

性別	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	1,260 (45.9)	338 (12.3)	71 (2.6)	3 (0.1)	21 (0.8)	660 (24.0)	219 (8.0)	173 (6.3)	1 (0.0)	2,746 (100.0)	34	1,686	4,466
女性 (%)	831 (47.2)	227 (12.9)	55 (3.1)	4 (0.2)	30 (1.7)	345 (19.6)	147 (8.3)	121 (6.9)	2 (0.1)	1,762 (100.0)	14	946	2,722
合計 (%)	2,091 (46.4)	565 (12.5)	126 (2.8)	7 (0.2)	51 (1.1)	1,005 (22.3)	366 (8.1)	294 (6.5)	3 (0.1)	4,508 (100.0)	48	2,632	7,188
記載なし (%)													
総計 (%)	2,091 (46.4)	565 (12.5)	126 (2.8)	7 (0.2)	51 (1.1)	1,005 (22.3)	366 (8.1)	294 (6.5)	3 (0.1)	4,508 (100.0)	48	2,632	7,188

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査