

表 3935 使用透析液の種類 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満(%)	16 (30.8)	13 (25.0)	8 (15.4)	4 (7.7)		1 (1.9)	2 (3.8)	7 (13.5)	1 (1.9)	52 (100.0)		45	97
15歳～(%)	36 (56.3)	11 (17.2)	5 (7.8)			4 (6.3)	6 (9.4)	2 (3.1)		64 (100.0)	1	27	92
30歳～(%)	161 (48.5)	37 (11.1)	7 (2.1)		4 (1.2)	73 (22.0)	23 (6.9)	27 (8.1)		332 (100.0)		193	525
45歳～(%)	478 (45.0)	122 (11.5)	24 (2.3)		4 (0.4)	243 (22.9)	107 (10.1)	84 (7.9)		1,062 (100.0)	11	606	1,679
60歳～(%)	999 (48.8)	258 (12.6)	46 (2.2)	2 (0.1)	16 (0.8)	449 (21.9)	171 (8.4)	105 (5.1)	1 (0.0)	2,047 (100.0)	23	1,163	3,233
75歳～(%)	377 (42.5)	118 (13.3)	29 (3.3)	1 (0.1)	24 (2.7)	221 (24.9)	52 (5.9)	64 (7.2)	1 (0.1)	887 (100.0)	13	560	1,460
90歳～(%)	24 (37.5)	6 (9.4)	7 (10.9)		3 (4.7)	14 (21.9)	5 (7.8)	5 (7.8)		64 (100.0)		38	102
合計(%)	2,091 (46.4)	565 (12.5)	126 (2.8)	7 (0.2)	51 (1.1)	1,005 (22.3)	366 (8.1)	294 (6.5)	3 (0.1)	4,508 (100.0)	48	2,632	7,188
不明(%)													
記載なし(%)													
総計(%)	2,091 (46.4)	565 (12.5)	126 (2.8)	7 (0.2)	51 (1.1)	1,005 (22.3)	366 (8.1)	294 (6.5)	3 (0.1)	4,508 (100.0)	48	2,632	7,188
平均	62.98	63.03	61.10	32.57	72.31	64.29	62.11	61.71	51.67	63.12	66.31	63.42	63.25
標準偏差	14.31	16.16	22.27	38.25	14.15	13.18	13.41	16.67	39.50	14.85	11.54	15.46	15.06

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査