

表 3936 使用透析液の種類 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析単独患者）

現在施行中のPD歴	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	727	96	29	4	32	231	33	55		1,197	6	49	1,252
(%)	(60.7)	(7.2)	(2.4)	(0.3)	(2.7)	(19.3)	(2.8)	(4.6)		(100.0)			
1年～	458	108	30	1	9	201	58	47		912	9	27	948
(%)	(50.2)	(11.8)	(3.3)	(0.1)	(1.0)	(22.0)	(6.4)	(5.2)		(100.0)			
2年～	511	166	36		7	306	111	80	1	1,218	25	26	1,269
(%)	(42.0)	(13.6)	(3.0)		(0.6)	(25.1)	(9.1)	(6.6)	(0.1)	(100.0)			
4年～	230	98	13	1	1	153	68	59	2	625	5	10	640
(%)	(36.8)	(15.7)	(2.1)	(0.2)	(0.2)	(24.5)	(10.9)	(9.4)	(0.3)	(100.0)			
6年～	80	42	7	1	1	52	52	29		264	1	4	269
(%)	(30.3)	(15.9)	(2.7)	(0.4)	(0.4)	(19.7)	(19.7)	(11.0)		(100.0)			
8年～	31	16	4			20	15	9		95	2	4	101
(%)	(32.6)	(16.8)	(4.2)			(21.1)	(15.8)	(9.5)		(100.0)			
10年～	27	29	5			15	20	12		108		1	109
(%)	(25.0)	(26.9)	(4.6)			(13.9)	(18.5)	(11.1)		(100.0)			
合計	2,064	545	124	7	50	978	357	291	3	4,419	48	121	4,588
(%)	(46.7)	(12.3)	(2.8)	(0.2)	(1.1)	(22.1)	(8.1)	(6.6)	(0.1)	(100.0)			
記載なし	27	20	2		1	27	9	3		89		2,511	2,600
(%)	(30.3)	(22.5)	(2.2)		(1.1)	(30.3)	(10.1)	(3.4)		(100.0)			
総計	2,091	565	126	7	51	1,005	366	294	3	4,508	48	2,632	7,188
(%)	(46.4)	(12.5)	(2.8)	(0.2)	(1.1)	(22.3)	(8.1)	(6.5)	(0.1)	(100.0)			
平均	2.27	3.64	3.18	1.98	1.16	2.76	4.27	3.68	4.81	2.81	2.87	2.08	2.80
標準偏差	2.33	3.34	3.79	2.56	1.33	2.34	3.22	3.04	1.49	2.74	2.03	2.22	2.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査