

表 3B37 使用透析液の種類 原疾患別（腹膜透析単独患者）

原疾患	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	742 (%)	186 (12.3)	29 (1.9)		13 (0.9)	327 (21.6)	134 (8.8)	83 (5.5)	2 (0.1)	1,518 (100.0)	16	797	2,329
慢性腎盂腎炎	28 (%)	8 (15.4)	2 (3.8)		1 (1.9)	8 (15.4)	2 (3.8)	3 (5.8)		52 (100.0)		27	79
急速進行性糸球体腎炎	15 (%)	9 (37.5)	1 (2.5)			8 (20.0)	5 (12.5)	2 (5.0)		40 (100.0)		24	64
妊婦腎/妊婦中毒症	7 (%)	3 (41.2)	2 (11.8)		1 (5.9)	2 (11.8)	1 (5.9)	1 (5.9)		17 (100.0)		5	22
その他の分岐不能の腎炎	18 (%)	7 (40.9)	2 (4.5)	1 (2.3)		10 (22.7)	2 (4.5)	4 (9.1)		44 (100.0)	1	21	66
多発性囊胞腎	78 (%)	16 (58.2)	3 (2.2)		1 (0.7)	24 (17.9)	4 (3.0)	7 (5.2)	1 (0.7)	134 (100.0)	2	70	206
腎硬化症	297 (%)	75 (48.8)	9 (1.5)	1 (0.2)	10 (1.6)	151 (24.8)	39 (6.4)	26 (4.3)		608 (100.0)	6	326	940
悪性高血圧	26 (%)	4 (53.1)		1 (2.0)		11 (22.4)	5 (10.2)	2 (4.1)		49 (100.0)	1	35	85
糖尿病性腎症	534 (%)	163 (39.8)	45 (3.4)	1 (0.1)	17 (1.3)	332 (24.8)	131 (9.8)	118 (8.8)		1,341 (100.0)	15	879	2,235
SLE腎炎	14 (%)	7 (42.4)				8 (24.2)	1 (3.0)	3 (9.1)		33 (100.0)	1	20	54
アミロイド腎	1 (%)					2 (50.0)	1 (25.0)			4 (100.0)		3	7
痛風腎	9 (%)	1 (50.0)	1 (5.6)			7 (38.9)				18 (100.0)	1	7	26
先天性代謝異常による腎不全	6 (%)		1 (9.1)			3 (27.3)	1 (9.1)			11 (100.0)		6	17
腎・尿路結核	1 (%)									1 (100.0)			1
腎・尿路結石	5 (%)					2 (25.0)	1 (12.5)			8 (100.0)		6	14
腎・尿路腫瘍	4 (%)					3 (37.5)	1 (12.5)			8 (100.0)	1	2	11
閉塞性尿路障害	9 (%)	1 (81.8)				1 (9.1)				11 (100.0)	1	7	19
骨髄腫						3 (100.0)				3 (100.0)		4	7
腎形成不全	19 (%)	8 (41.3)	9 (19.6)	2 (4.3)		3 (6.5)	3 (6.5)	2 (4.3)		46 (100.0)		26	72
不明	207 (%)	49 (50.5)	14 (3.4)		5 (1.2)	77 (18.8)	24 (5.9)	34 (8.3)		410 (100.0)	3	276	689
再導入	10 (%)	7 (38.5)				1 (3.8)	5 (19.2)	3 (11.5)		26 (100.0)		10	36
その他	61 (%)	21 (47.7)	8 (18.4)	1 (0.8)	3 (2.3)	22 (17.2)	6 (4.7)	6 (4.7)		128 (100.0)		81	209
合計	2,091 (46.4)	565 (12.5)	128 (2.8)	7 (0.2)	51 (1.1)	1,005 (22.3)	366 (8.1)	294 (6.5)	3 (0.1)	4,508 (100.0)	48	2,632	7,188
記載なし													
総計	2,091 (46.4)	565 (12.5)	128 (2.8)	7 (0.2)	51 (1.1)	1,005 (22.3)	366 (8.1)	294 (6.5)	3 (0.1)	4,508 (100.0)	48	2,632	7,188

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査