

表 3940 使用透析液の種類 併用の状況別 (PD・HD(F)等併用患者)

併用の状況	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)													
PD単独 (%)													
HD(F)単独,PDカテあり (%)													
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	156 (17.9)	189 (21.7)	37 (4.2)	1 (0.1)	5 (0.6)	194 (22.2)	164 (18.8)	124 (14.2)	2 (0.2)	872 (100.0)	17	655	1,544
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	19 (18.8)	22 (21.8)	10 (9.9)		1 (1.0)	16 (15.8)	17 (16.8)	15 (14.9)	1 (1.0)	101 (100.0)		40	141
PD,HD併用週3 HD(F) (%)													
PD,HD併用週4 HD(F) (%)													
PD,HD併用その他 (%)	9 (18.8)	10 (20.8)	4 (8.3)			7 (14.6)	12 (25.0)	6 (12.5)		48 (100.0)		15	63
合計 (%)	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査