

表 3941 使用透析液の種類 性別 (PD+HD(F)等併用患者)

性別	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	139 (19.1)	150 (20.6)	32 (4.4)	1 (0.1)	4 (0.5)	163 (22.4)	120 (16.5)	117 (16.1)	2 (0.3)	728 (100.0)	15	529	1,272
女性 (%)	45 (15.4)	71 (24.2)	19 (6.5)		2 (0.7)	54 (18.4)	73 (24.9)	28 (9.6)	1 (0.3)	293 (100.0)	2	181	476
合計 (%)	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748
記載なし (%)													
総計 (%)	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査