

表 3942 使用透析液の種類 年齢(歳)別 (PD・HD(F)等併用患者)

年齢	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキスト リンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ 糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)													
15歳～ (%)													
30歳～ (%)	18 (18.2)		4 (40.0)	17 (17.2)	7 (7.1)								
45歳～ (%)	60 (17.1)		60 (17.1)	24 (6.9)									
60歳～ (%)	90 (19.1)		121 (25.7)	18 (3.8)	1 (0.2)								
75歳～ (%)	16 (17.8)		18 (20.0)	2 (2.2)									
90歳～ (%)	1 (50.0)												
合計 (%)	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748
平均	60.20	60.72	56.92	74.00	57.17	61.05	58.32	58.06	51.67	59.64	61.47	58.35	59.14
標準偏差	10.65	11.69	10.81		5.98	12.67	10.18	12.12	26.58	11.56	12.29	11.56	11.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査