

表 3943 使用透析液の種類 現在施行中のPD歴(年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

現在施行中のPD歴	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	15	3	2			8	4	6		38	2	1	41
(%)	(39.5)	(7.9)	(5.3)			(21.1)	(10.5)	(15.8)		(100.0)			
1年～	12	17	7			28	14	14		95	4	3	102
(%)	(12.6)	(17.9)	(7.4)		(3.2)	(29.5)	(14.7)	(14.7)		(100.0)			
2年～	37	37	13			63	33	40	1	224	8	12	244
(%)	(16.5)	(16.5)	(5.8)			(28.1)	(14.7)	(17.9)	(0.4)	(100.0)			
4年～	35	37	10			56	47	31		217	2	9	228
(%)	(16.1)	(17.1)	(4.6)		(0.5)	(25.8)	(21.7)	(14.3)		(100.0)			
6年～	31	44	4			27	41	26	1	175	1	6	182
(%)	(17.7)	(25.1)	(2.3)		(0.6)	(15.4)	(23.4)	(14.9)	(0.6)	(100.0)			
8年～	19	33	4			20	21	10	1	108		4	112
(%)	(17.6)	(30.6)	(3.7)			(18.5)	(19.4)	(9.3)	(0.9)	(100.0)			
10年～	31	44	9	1	1	14	30	13		143		2	145
(%)	(21.7)	(30.8)	(6.3)	(0.7)	(0.7)	(9.8)	(21.0)	(9.1)		(100.0)			
合計	180	215	49	1	6	216	190	140	3	1,000	17	37	1,054
(%)	(18.0)	(21.5)	(4.9)	(0.1)	(0.6)	(21.6)	(19.0)	(14.0)	(0.3)	(100.0)			
記載なし	4	6	2			1	3	5		21		673	694
(%)	(19.0)	(28.6)	(9.5)			(4.8)	(14.3)	(23.8)		(100.0)			
総計	184	221	51	1	6	217	193	145	3	1,021	17	710	1,748
(%)	(18.0)	(21.6)	(5.0)	(0.1)	(0.6)	(21.3)	(18.9)	(14.2)	(0.3)	(100.0)			
平均	6.24	7.12	5.72	12.83	4.49	4.82	6.49	5.16	6.31	5.99	2.99	4.98	5.90
標準偏差	4.57	4.36	4.19		3.89	3.08	4.11	3.46	3.38	4.05	1.77	3.07	4.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査