

表 3944 使用透析液の種類 原疾患別（PD・HD/F等併用患者）

原疾患	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	88 (%)	122 (26.3)	19 (4.1)	1 (0.2)	2 (0.4)	91 (19.7)	92 (19.9)	47 (10.2)	1 (0.2)	463 (100.0)	3	261	727
慢性腎盂腎炎	2 (%)	2 (18.2)				1 (9.1)	6 (54.5)			11 (100.0)		3	14
急速進行性糸球体腎炎		1 (%)				2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)		6 (100.0)		4	10
妊婦腎/妊婦中毒症	2 (%)					1 (14.3)	2 (28.6)	2 (28.6)		7 (100.0)		3	10
その他の分岐不整の腎炎	3 (%)	2 (27.3)				4 (36.4)	1 (9.1)	1 (9.1)		11 (100.0)	1	7	19
多発性嚢胞腎	5 (%)	3 (12.5)				10 (41.7)	4 (16.7)	2 (8.3)		24 (100.0)		13	37
腎硬化症	8 (%)	15 (10.0)	4 (5.0)			24 (30.0)	9 (11.3)	20 (25.0)		80 (100.0)	2	61	143
悪性高血圧	3 (%)	1 (6.7)	2 (13.3)			1 (6.7)	4 (26.7)	4 (26.7)		15 (100.0)		7	22
糖尿病性腎症	48 (%)	45 (17.1)	20 (7.1)		3 (1.1)	57 (20.4)	51 (18.2)	55 (19.6)	1 (0.4)	280 (100.0)	11	239	530
SLE腎炎	1 (%)		1 (20.0)				2 (40.0)		1 (20.0)	5 (100.0)		3	8
アミロイド腎						1 (100.0)				1 (100.0)		1	2
痛風腎	2 (%)	2 (33.3)					1 (16.7)	1 (16.7)		6 (100.0)		1	7
先天性代謝異常による腎不全							1 (100.0)			1 (100.0)			1
腎・尿路結核													
腎・尿路結石			1 (100.0)							1 (100.0)		1	2
腎・尿路腫瘍	1 (%)	1 (50.0)								2 (100.0)		1	3
閉塞性尿路障害		1 (100.0)								1 (100.0)		2	3
骨髄腫												1	1
腎形成不全	1 (%)		1 (33.3)			1 (33.3)				3 (100.0)		1	4
不明	15 (%)	16 (21.9)	2 (2.7)			18 (24.7)	15 (20.5)	7 (9.6)		73 (100.0)		77	150
再導入	1 (%)	4 (44.4)	1 (11.1)			1 (11.1)		2 (22.2)		9 (100.0)		6	15
その他	4 (%)	6 (27.3)			1 (4.5)	5 (22.7)	4 (18.2)	2 (9.1)		22 (100.0)		18	40
合計	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748
記載なし													
総計	184 (18.0)	221 (21.6)	51 (5.0)	1 (0.1)	6 (0.6)	217 (21.3)	193 (18.9)	145 (14.2)	3 (0.3)	1,021 (100.0)	17	710	1,748

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査