

表 3945 使用透析液の種類 医療機関別 (PD・HD(F)等併用患者)

医療機関	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	12	8				8	7	1		36		33	69
(%)	(33.3)	(22.2)				(22.2)	(19.4)	(2.8)		(100.0)			
私立大学	10	21	3			17	15	14		80		86	166
(%)	(12.5)	(26.3)	(3.8)			(21.3)	(18.8)	(17.5)		(100.0)			
国立	1	2				1	3	2		9		8	17
(%)	(11.1)	(22.2)				(11.1)	(33.3)	(22.2)		(100.0)			
県市町村立	22	23	3		1	42	41	20	1	153		113	266
(%)	(14.4)	(15.0)	(2.0)		(0.7)	(27.5)	(26.8)	(13.1)	(0.7)	(100.0)			
社会保険	5	8	1			11				25		24	49
(%)	(20.0)	(32.0)	(4.0)			(44.0)				(100.0)			
厚生連	5	20	3			18	14	25		85	1	46	132
(%)	(5.9)	(23.5)	(3.5)			(21.2)	(16.5)	(29.4)		(100.0)			
その他公的	19	27	5			26	21	20		118		112	230
(%)	(16.1)	(22.9)	(4.2)			(22.0)	(17.8)	(16.9)		(100.0)			
私立総合	20	31	9			7	19	19		105		17	122
(%)	(19.0)	(29.5)	(8.6)			(6.7)	(18.1)	(18.1)		(100.0)			
私立	40	35	12		2	46	34	26	1	196	15	175	386
(%)	(20.4)	(17.9)	(6.1)		(1.0)	(23.5)	(17.3)	(13.3)	(0.5)	(100.0)			
私立診療所	50	46	15	1	3	41	39	18	1	214	1	96	311
(%)	(23.4)	(21.5)	(7.0)	(0.5)	(1.4)	(19.2)	(18.2)	(8.4)	(0.5)	(100.0)			
総計	184	221	51	1	6	217	193	145	3	1,021	17	710	1,748
(%)	(18.0)	(21.6)	(5.0)	(0.1)	(0.6)	(21.3)	(18.9)	(14.2)	(0.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査