

表 3946 一日透析液使用量(L/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	78	291	664	1,080	733	57	31	2,934	2,087	5,021	6.04	2.28
(%)	(2.7)	(9.9)	(22.6)	(36.8)	(25.0)	(1.9)	(1.1)	(100.0)				
腹膜透析 (APD)	29	89	344	536	447	215	89	1,749	1,090	2,839	7.32	2.77
(%)	(1.7)	(5.1)	(19.7)	(30.6)	(25.6)	(12.3)	(5.1)	(100.0)				
腹膜透析 (CCPD)	12	13	64	179	226	138	81	713	368	1,081	8.56	3.06
(%)	(1.7)	(1.8)	(9.0)	(25.1)	(31.7)	(19.4)	(11.4)	(100.0)				
合計	119	393	1,072	1,795	1,406	410	201	5,396	3,545	8,941	6.78	2.71
(%)	(2.2)	(7.3)	(19.9)	(33.3)	(26.1)	(7.6)	(3.7)	(100.0)				
記載なし (%)												
総計	119	393	1,072	1,795	1,406	410	201	5,396	3,545	8,941	6.78	2.71
(%)	(2.2)	(7.3)	(19.9)	(33.3)	(26.1)	(7.6)	(3.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査