

表 3947 一日透析液使用量(L/日) 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)												
PD単独 (%)	106 (2.4)	371 (8.4)	986 (22.4)	1,493 (33.9)	1,041 (23.7)	273 (6.2)	129 (2.9)	4,399 (100.0)	2,789	7,188	6.53	2.70
HD(F)単独.PDカテ あり (%)												
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	12 (1.4)	15 (1.8)	70 (8.2)	253 (29.7)	321 (37.7)	118 (13.9)	62 (7.3)	851 (100.0)	693	1,544	7.97	2.47
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	1 (1.0)	4 (4.0)	16 (16.2)	36 (36.4)	24 (24.2)	12 (12.1)	6 (6.1)	99 (100.0)	42	141	7.26	2.54
PD.HD併用週3 HD(F) (%)												
PD.HD併用週4 HD(F) (%)												
PD.HD併用その他 (%)		3 (6.8)		13 (29.5)	20 (45.5)	5 (11.4)	3 (6.8)	44 (100.0)	19	63	7.88	2.19
合計 (%)	119 (2.2)	393 (7.3)	1,072 (19.9)	1,795 (33.3)	1,406 (26.1)	408 (7.6)	200 (3.7)	5,393 (100.0)	3,543	8,936	6.78	2.71
不明 (%)						2 (66.7)	1 (33.3)	3 (100.0)	2	5	11.30	1.61
記載なし (%)												
総計 (%)	119 (2.2)	393 (7.3)	1,072 (19.9)	1,795 (33.3)	1,406 (26.1)	410 (7.6)	201 (3.7)	5,396 (100.0)	3,545	8,941	6.78	2.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査