

表 3948 一日透析液使用量(L/日) 性別(腹膜透析患者)

性別	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	56 (1.7)	190 (5.6)	582 (17.2)	1,061 (31.3)	1,023 (30.2)	306 (9.0)	167 (4.9)	3,385 (100.0)	2,357	5,742	7.16	2.79
女性 (%)	63 (3.1)	203 (10.1)	490 (24.4)	734 (36.5)	383 (19.0)	104 (5.2)	34 (1.7)	2,011 (100.0)	1,188	3,199	6.15	2.46
合計 (%)	119 (2.2)	393 (7.3)	1,072 (19.9)	1,795 (33.3)	1,406 (26.1)	410 (7.6)	201 (3.7)	5,396 (100.0)	3,545	8,941	6.78	2.71
記載なし (%)												
総計 (%)	119 (2.2)	393 (7.3)	1,072 (19.9)	1,795 (33.3)	1,406 (26.1)	410 (7.6)	201 (3.7)	5,396 (100.0)	3,545	8,941	6.78	2.71

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査